

表 931 体重減少量(kg) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

性別	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	122 (0.3)	1,055 (2.9)	6,250 (17.2)	14,659 (40.3)	10,376 (28.5)	3,098 (8.5)	629 (1.7)	125 (0.3)	29 (0.1)	7 (0.0)	36,350 (100.0)	817	37,167	2.74	1.02
女性 (%)	86 (0.4)	1,023 (4.9)	6,676 (32.3)	9,852 (47.6)	2,679 (13.0)	326 (1.6)	28 (0.1)	6 (0.0)	1 (0.0)	3 (0.0)	20,680 (100.0)	483	21,163	2.18	0.79
合計 (%)	208 (0.4)	2,078 (3.6)	12,926 (22.7)	24,511 (43.0)	13,055 (22.9)	3,424 (6.0)	657 (1.2)	131 (0.2)	30 (0.1)	10 (0.0)	57,030 (100.0)	1,300	58,330	2.54	0.98
記載なし (%)															
総計 (%)	208 (0.4)	2,078 (3.6)	12,926 (22.7)	24,511 (43.0)	13,055 (22.9)	3,424 (6.0)	657 (1.2)	131 (0.2)	30 (0.1)	10 (0.0)	57,030 (100.0)	1,300	58,330	2.54	0.98

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D2320##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査