

表 933 体重減少量(kg) 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	0.0未満	0.0 ~	1.0 ~	2.0 ~	3.0 ~	4.0 ~	5.0 ~	6.0 ~	7.0 ~	8.0 ~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年末満 (%)															
2年 ~ (%)	83 (0.5)	724 (4.6)	3,451 (22.1)	6,509 (41.7)	3,563 (22.8)	991 (6.4)	218 (1.4)	50 (0.3)	10 (0.1)	1 (0.0)	15,600 (100.0)	338	15,938	2.54	1.03
5年 ~ (%)	53 (0.3)	582 (3.4)	3,523 (20.5)	7,131 (41.5)	4,338 (25.3)	1,245 (7.3)	237 (1.4)	40 (0.2)	14 (0.1)	4 (0.0)	17,167 (100.0)	415	17,582	2.62	1.00
10年 ~ (%)	29 (0.3)	265 (2.7)	2,042 (20.7)	4,260 (43.2)	2,422 (24.5)	697 (7.1)	123 (1.2)	22 (0.2)	4 (0.0)	2 (0.0)	9,866 (100.0)	250	10,116	2.62	0.97
15年 ~ (%)	15 (0.3)	188 (3.2)	1,347 (22.7)	2,698 (45.5)	1,343 (22.6)	281 (4.7)	47 (0.8)	11 (0.2)	1 (0.0)		5,931 (100.0)	127	6,058	2.50	0.91
20年 ~ (%)	12 (0.3)	121 (3.2)	958 (25.3)	1,821 (48.0)	737 (19.4)	120 (3.2)	19 (0.5)	4 (0.1)	1 (0.0)		3,793 (100.0)	64	3,857	2.41	0.85
25年 ~ (%)	5 (0.2)	76 (3.3)	721 (31.4)	1,043 (45.5)	375 (16.3)	63 (2.7)	8 (0.3)	2 (0.1)		1 (0.0)	2,294 (100.0)	51	2,345	2.30	0.85
30年 ~ (%)	5 (0.4)	64 (4.8)	462 (34.6)	598 (44.8)	183 (13.7)	18 (1.3)	3 (0.2)			2 (0.1)	1,335 (100.0)	32	1,367	2.18	0.85
35年 ~ (%)	5 (0.7)	39 (5.1)	284 (37.1)	348 (45.4)	80 (10.4)	7 (0.9)	1 (0.1)	2 (0.3)			766 (100.0)	14	780	2.07	0.79
40年 ~ (%)	1 (0.4)	19 (6.8)	138 (49.6)	103 (37.1)	14 (5.0)	2 (0.7)	1 (0.4)				278 (100.0)	9	287	1.88	0.69
合計 (%)	208 (0.4)	2,078 (3.6)	12,926 (22.7)	24,511 (43.0)	13,055 (22.9)	3,424 (6.0)	657 (1.2)	131 (0.2)	30 (0.1)	10 (0.0)	57,030 (100.0)	1,300	58,330	2.54	0.98
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	208 (0.4)	2,078 (3.6)	12,926 (22.7)	24,511 (43.0)	13,055 (22.9)	3,424 (6.0)	657 (1.2)	131 (0.2)	30 (0.1)	10 (0.0)	57,030 (100.0)	1,300	58,330	2.54	0.98
平均	9.46	10.17	11.76	10.90	9.69	8.61	7.99	8.15	6.63	14.90	10.61	10.43	10.60		
標準偏差	8.85	9.11	9.47	8.42	7.17	6.00	5.75	6.72	4.95	11.68	8.33	8.21	8.33		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2322##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査