

表 934 体重減少量(kg) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

原疾患	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	76 (0.4)	659 (3.3)	4,894 (24.2)	8,978 (44.3)	4,460 (22.0)	975 (4.8)	169 (0.8)	32 (0.2)	5 (0.0)	5 (0.0)	20,253 (100.0)	447	20,700	2.48	0.93
慢性腎盂腎炎 (%)	5 (0.9)	31 (5.6)	156 (28.1)	244 (43.9)	95 (17.1)	21 (3.8)	2 (0.4)	1 (0.2)	1 (0.2)		556 (100.0)	15	571	2.30	0.97
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1 (0.3)	21 (5.3)	97 (24.6)	175 (44.3)	80 (20.3)	18 (4.6)	2 (0.5)		1 (0.3)		395 (100.0)	2	397	2.43	0.95
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)		12 (2.7)	153 (34.7)	207 (46.9)	60 (13.6)	7 (1.6)	1 (0.2)	1 (0.2)			441 (100.0)	6	447	2.26	0.78
その他の分類不能の腎炎 (%)	4 (1.3)	13 (4.2)	67 (21.7)	127 (41.1)	76 (24.6)	16 (5.2)	4 (1.3)	2 (0.6)			309 (100.0)	8	317	2.52	1.07
多発性嚢胞腎 (%)	9 (0.4)	87 (3.8)	577 (25.4)	1,037 (45.7)	475 (20.9)	76 (3.4)	7 (0.3)				2,268 (100.0)	45	2,313	2.40	0.86
腎硬化症 (%)	17 (0.4)	203 (4.6)	1,179 (26.5)	1,907 (42.9)	853 (19.2)	230 (5.2)	39 (0.9)	10 (0.2)	3 (0.1)	1 (0.0)	4,442 (100.0)	102	4,544	2.42	0.98
悪性高血圧 (%)	2 (0.4)	14 (3.0)	70 (15.1)	189 (40.6)	131 (28.2)	49 (10.5)	9 (1.9)	1 (0.2)			465 (100.0)	9	474	2.78	1.02
糖尿病性腎症 (%)	55 (0.3)	618 (3.2)	3,620 (18.7)	7,952 (41.1)	5,074 (26.2)	1,609 (8.3)	326 (1.7)	62 (0.3)	18 (0.1)	3 (0.0)	19,337 (100.0)	445	19,782	2.69	1.02
SLE腎炎 (%)	3 (0.6)	29 (6.2)	129 (27.5)	224 (47.8)	70 (14.9)	13 (2.8)	1 (0.2)				469 (100.0)	11	480	2.25	0.89
アミロイド腎 (%)	1 (1.4)	7 (10.1)	21 (30.4)	27 (39.1)	12 (17.4)	1 (1.4)					69 (100.0)	1	70	2.05	0.95
痛風腎 (%)		6 (3.0)	51 (25.2)	84 (41.6)	47 (23.3)	11 (5.4)	2 (1.0)	1 (0.5)			202 (100.0)	5	207	2.52	0.96
先天性代謝異常による腎不全 (%)	1 (1.6)	4 (6.3)	16 (25.0)	25 (39.1)	12 (18.8)	6 (9.4)					64 (100.0)	2	66	2.44	1.05
腎・尿路結核 (%)	1 (2.6)	6 (15.4)	10 (25.6)	14 (35.9)	8 (20.5)						39 (100.0)	1	40	2.00	1.04
腎・尿路結石 (%)	1 (1.0)	4 (4.2)	21 (21.9)	43 (44.8)	21 (21.9)	5 (5.2)	1 (1.0)				96 (100.0)	4	100	2.47	0.97
腎・尿路腫瘍 (%)		5 (3.6)	28 (20.4)	69 (50.4)	32 (23.4)	3 (2.2)					137 (100.0)	2	139	2.45	0.77
閉塞性尿路障害 (%)	2 (1.5)	5 (3.8)	39 (29.5)	52 (39.4)	26 (19.7)	7 (5.3)	1 (0.8)				132 (100.0)		132	2.38	1.07
骨髄腫 (%)		2 (9.5)	7 (33.3)	9 (42.9)	2 (9.5)	1 (4.8)					21 (100.0)	1	22	2.18	0.94
腎形成不全 (%)		4 (2.6)	35 (22.9)	68 (44.4)	30 (19.6)	15 (9.8)		1 (0.7)			153 (100.0)		153	2.60	0.95
不明 (%)	25 (0.5)	248 (4.7)	1,279 (24.3)	2,284 (43.5)	1,065 (20.3)	275 (5.2)	63 (1.2)	13 (0.2)	1 (0.0)		5,253 (100.0)	151	5,404	2.45	0.99
再導入 (%)	1 (0.2)	17 (3.1)	135 (24.5)	229 (41.6)	128 (23.2)	34 (6.2)	5 (0.9)	2 (0.4)			551 (100.0)	13	564	2.55	0.95
その他 (%)	4 (0.3)	83 (6.0)	342 (24.8)	567 (41.1)	298 (21.6)	52 (3.8)	25 (1.8)	5 (0.4)	1 (0.1)	1 (0.1)	1,378 (100.0)	30	1,408	2.44	1.05
合計 (%)	208 (0.4)	2,078 (3.6)	12,926 (22.7)	24,511 (43.0)	13,055 (22.9)	3,424 (6.0)	657 (1.2)	131 (0.2)	30 (0.1)	10 (0.0)	57,030 (100.0)	1,300	58,330	2.54	0.98
記載なし (%)															
総計 (%)	208 (0.4)	2,078 (3.6)	12,926 (22.7)	24,511 (43.0)	13,055 (22.9)	3,424 (6.0)	657 (1.2)	131 (0.2)	30 (0.1)	10 (0.0)	57,030 (100.0)	1,300	58,330	2.54	0.98

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

##D2323##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査