

表 936 体重減少率(%) 性別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

性別	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	2,012 (2.0)	3,723 (3.7)	10,322 (10.4)	20,331 (20.4)	27,247 (27.3)	20,933 (21.0)	9,906 (9.9)	3,566 (3.6)	1,121 (1.1)	514 (0.5)	99,675 (100.0)	2,815	102,490	4.43	1.60
女性 (%)	1,272 (2.2)	2,228 (3.9)	5,723 (10.0)	11,252 (19.7)	14,914 (26.1)	11,796 (20.7)	6,038 (10.6)	2,518 (4.4)	876 (1.5)	440 (0.8)	57,057 (100.0)	1,586	58,643	4.49	1.69
合計 (%)	3,284 (2.1)	5,951 (3.8)	16,045 (10.2)	31,583 (20.2)	42,161 (26.9)	32,729 (20.9)	15,944 (10.2)	6,084 (3.9)	1,997 (1.3)	954 (0.6)	156,732 (100.0)	4,401	161,133	4.45	1.63
記載なし (%)															
総計 (%)	3,284 (2.1)	5,951 (3.8)	16,045 (10.2)	31,583 (20.2)	42,161 (26.9)	32,729 (20.9)	15,944 (10.2)	6,084 (3.9)	1,997 (1.3)	954 (0.6)	156,732 (100.0)	4,401	161,133	4.45	1.63

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2410##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査