

表937 体重減少率(%) 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

年齢	1.0未満	1.0~	2.0~	3.0~	4.0~	5.0~	6.0~	7.0~	8.0~	9.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)	1 (33.3)	1 (33.3)		1 (33.3)							3 (100.0)		3 300	1.80	1.40
15歳~ (%)	9 (3.2)	8 (2.8)	13 (4.6)	43 (15.1)	61 (21.5)	49 (17.3)	46 (16.2)	33 (11.6)	16 (5.6)	6 (2.1)	284 (100.0)	16		5.17	2.02
30歳~ (%)	103 (1.8)	123 (2.2)	359 (6.4)	882 (15.8)	1,440 (25.8)	1,285 (23.0)	802 (14.4)	379 (6.8)	138 (2.5)	74 (1.3)	5,585 (100.0)	168	5,753	4.91	1.71
45歳~ (%)	467 (1.8)	705 (2.7)	2,194 (8.4)	4,632 (17.7)	7,118 (27.2)	6,072 (23.2)	3,118 (11.9)	1,262 (4.8)	415 (1.6)	209 (0.8)	26,192 (100.0)	761	26,953	4.67	1.62
60歳~ (%)	1,345 (1.9)	2,572 (3.6)	7,085 (10.0)	14,405 (20.2)	19,662 (27.6)	15,130 (21.3)	7,130 (10.0)	2,651 (3.7)	854 (1.2)	365 (0.5)	71,199 (100.0)	1,991	73,190	4.46	1.60
75歳~ (%)	1,248 (2.5)	2,351 (4.7)	5,989 (11.9)	10,908 (21.7)	13,121 (26.1)	9,643 (19.2)	4,547 (9.0)	1,667 (3.3)	535 (1.1)	287 (0.6)	50,296 (100.0)	1,380	51,676	4.30	1.65
90歳~ (%)	111 (3.5)	191 (6.0)	405 (12.8)	712 (22.4)	759 (23.9)	550 (17.3)	301 (9.5)	92 (2.9)	39 (1.2)	13 (0.4)	3,173 (100.0)	85	3,258	4.16	1.72
合計 (%)	3,284 (2.1)	5,951 (3.8)	16,045 (10.2)	31,583 (20.2)	42,161 (26.9)	32,729 (20.9)	15,944 (10.2)	6,084 (3.9)	1,997 (1.3)	954 (0.6)	156,732 (100.0)	4,401	161,133	4.45	1.63
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	3,284 (2.1)	5,951 (3.8)	16,045 (10.2)	31,583 (20.2)	42,161 (26.9)	32,729 (20.9)	15,944 (10.2)	6,084 (3.9)	1,997 (1.3)	954 (0.6)	156,732 (100.0)	4,401	161,133	4.45	1.63
平均	70.43	71.48	70.59	69.72	68.57	67.86	67.20	66.40	66.01	66.01	68.74	68.43	68.73		
標準偏差	12.58	11.51	11.47	11.67	11.81	12.07	12.64	13.18	13.67	14.05	12.06	12.32	12.07		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D2411##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査