

表 940 体重減少率(%) 医療機関別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

医療機関	1.0未満	1.0~	2.0~	3.0~	4.0~	5.0~	6.0~	7.0~	8.0~	9.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	23	30	63	65	50	36	18	3	2		290	4	294	3.46	1.74
(%)	(7.9)	(10.3)	(21.7)	(22.4)	(17.2)	(12.4)	(6.2)	(1.0)	(0.7)		(100.0)				
私立大学	25	55	120	184	226	165	102	31	11	5	924	106	1,030	4.26	1.70
(%)	(2.7)	(6.0)	(13.0)	(19.9)	(24.5)	(17.9)	(11.0)	(3.4)	(1.2)	(0.5)	(100.0)				
国立病院機構等	8	13	32	42	87	63	35	11	2	2	295	41	336	4.48	1.64
(%)	(2.7)	(4.4)	(10.8)	(14.2)	(29.5)	(21.4)	(11.9)	(3.7)	(0.7)	(0.7)	(100.0)				
県市町村立・国保	178	330	841	1,739	2,383	1,880	922	318	93	46	8,730	681	9,411	4.47	1.60
(%)	(2.0)	(3.8)	(9.6)	(19.9)	(27.3)	(21.5)	(10.6)	(3.6)	(1.1)	(0.5)	(100.0)				
JCHO(旧社会保険)等	40	60	178	362	514	411	184	59	27	10	1,845	22	1,867	4.49	1.62
(%)	(2.2)	(3.3)	(9.6)	(19.6)	(27.9)	(22.3)	(10.0)	(3.2)	(1.5)	(0.5)	(100.0)				
厚生連等	87	151	341	785	1,239	1,057	520	229	65	24	4,498	315	4,813	4.64	1.63
(%)	(1.9)	(3.4)	(7.6)	(17.5)	(27.5)	(23.5)	(11.6)	(5.1)	(1.4)	(0.5)	(100.0)				
その他公的	118	171	490	989	1,267	987	486	143	43	20	4,714	233	4,947	4.38	1.59
(%)	(2.5)	(3.6)	(10.4)	(21.0)	(26.9)	(20.9)	(10.3)	(3.0)	(0.9)	(0.4)	(100.0)				
私立総合	79	132	322	742	948	749	326	123	32	27	3,480	78	3,558	4.44	1.66
(%)	(2.3)	(3.8)	(9.3)	(21.3)	(27.2)	(21.5)	(9.4)	(3.5)	(0.9)	(0.8)	(100.0)				
私立	1,329	2,160	5,169	9,244	11,669	9,059	4,681	1,853	612	303	46,079	1,341	47,420	4.37	1.72
(%)	(2.9)	(4.7)	(11.2)	(20.1)	(25.3)	(19.7)	(10.2)	(4.0)	(1.3)	(0.7)	(100.0)				
私立診療所	1,397	2,849	8,489	17,431	23,778	18,322	8,670	3,314	1,110	517	85,877	1,580	87,457	4.50	1.59
(%)	(1.6)	(3.3)	(9.9)	(20.3)	(27.7)	(21.3)	(10.1)	(3.9)	(1.3)	(0.6)	(100.0)				
総計	3,284	5,951	16,045	31,583	42,161	32,729	15,944	6,084	1,997	954	156,732	4,401	161,133	4.45	1.63
(%)	(2.1)	(3.8)	(10.2)	(20.2)	(26.9)	(20.9)	(10.2)	(3.9)	(1.3)	(0.6)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2414##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査