

表 941 体重減少率(%) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

| 性別 | 1.0未満 | 1.0～ | 2.0～ | 3.0～ | 4.0～ | 5.0～ | 6.0～ | 7.0～ | 8.0～ | 9.0～ | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|-------|--------|------|------|
| 男性 (%) | 546 (1.5) | 1,094 (3.0) | 3,480 (9.6) | 7,693 (21.2) | 10,428 (28.7) | 7,672 (21.1) | 3,647 (10.0) | 1,230 (3.4) | 377 (1.0) | 183 (0.5) | 36,350 (100.0) | 817 | 37,167 | 4.48 | 1.52 |
| 女性 (%) | 331 (1.6) | 702 (3.4) | 2,002 (9.7) | 4,244 (20.5) | 5,597 (27.1) | 4,456 (21.5) | 2,162 (10.5) | 786 (3.8) | 295 (1.4) | 105 (0.5) | 20,680 (100.0) | 483 | 21,163 | 4.50 | 1.59 |
| 合計 (%) | 877 (1.5) | 1,796 (3.1) | 5,482 (9.6) | 11,937 (20.9) | 16,025 (28.1) | 12,128 (21.3) | 5,809 (10.2) | 2,016 (3.5) | 672 (1.2) | 288 (0.5) | 57,030 (100.0) | 1,300 | 58,330 | 4.49 | 1.55 |
| 記載なし (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総計 (%) | 877 (1.5) | 1,796 (3.1) | 5,482 (9.6) | 11,937 (20.9) | 16,025 (28.1) | 12,128 (21.3) | 5,809 (10.2) | 2,016 (3.5) | 672 (1.2) | 288 (0.5) | 57,030 (100.0) | 1,300 | 58,330 | 4.49 | 1.55 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2420##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査