

表 942 体重減少率(%) 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

年齢	1.0未満	1.0~	2.0~	3.0~	4.0~	5.0~	6.0~	7.0~	8.0~	9.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)															
15歳~ (%)	4 (2.5)	2 (1.2)	12 (7.5)	19 (11.8)	36 (22.4)	46 (28.6)	22 (13.7)	16 (9.9)	2 (1.2)	2 (1.2)	161 (100.0)	6	167	5.00	1.71
30歳~ (%)	28 (0.9)	63 (2.1)	197 (6.5)	447 (14.9)	820 (27.2)	711 (23.6)	431 (14.3)	189 (6.3)	78 (2.6)	46 (1.5)	3,010 (100.0)	72	3,082	4.97	1.65
45歳~ (%)	193 (1.5)	336 (2.6)	978 (7.7)	2,513 (19.7)	3,526 (27.7)	2,967 (23.3)	1,492 (11.7)	499 (3.9)	159 (1.2)	78 (0.6)	12,741 (100.0)	287	13,028	4.62	1.53
60歳~ (%)	367 (1.4)	832 (3.1)	2,600 (9.7)	5,696 (21.3)	7,654 (28.6)	5,660 (21.2)	2,609 (9.8)	904 (3.4)	286 (1.1)	110 (0.4)	26,718 (100.0)	609	27,327	4.46	1.52
75歳~ (%)	260 (1.9)	528 (3.9)	1,605 (11.7)	3,101 (22.6)	3,820 (27.9)	2,613 (19.1)	1,201 (8.8)	391 (2.9)	143 (1.0)	50 (0.4)	13,712 (100.0)	311	14,023	4.31	1.56
90歳~ (%)	25 (3.6)	35 (5.1)	90 (13.1)	161 (23.4)	169 (24.6)	131 (19.0)	54 (7.8)	17 (2.5)	4 (0.6)	2 (0.3)	688 (100.0)	15	703	4.12	1.69
合計 (%)	877 (1.5)	1,796 (3.1)	5,482 (9.6)	11,937 (20.9)	16,025 (28.1)	12,128 (21.3)	5,809 (10.2)	2,016 (3.5)	672 (1.2)	288 (0.5)	57,030 (100.0)	1,300	58,330	4.49	1.55
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	877 (1.5)	1,796 (3.1)	5,482 (9.6)	11,937 (20.9)	16,025 (28.1)	12,128 (21.3)	5,809 (10.2)	2,016 (3.5)	672 (1.2)	288 (0.5)	57,030 (100.0)	1,300	58,330	4.49	1.55
平均	67.57	68.09	67.95	66.96	65.93	64.90	64.06	63.28	63.09	60.72	65.87	65.91	65.87		
標準偏差	12.81	12.00	11.86	11.78	12.02	12.35	12.64	13.38	13.87	14.85	12.27	12.29	12.27		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2421##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査