

表 944 体重減少率(%) 原疾患別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

原疾患	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	258 (1.3)	565 (2.8)	1,837 (9.1)	4,030 (19.9)	5,627 (27.8)	4,554 (22.5)	2,266 (11.2)	764 (3.8)	259 (1.3)	93 (0.5)	20,253 (100.0)	447	20,700	4.57	1.54
慢性腎盂腎炎 (%)	14 (2.5)	20 (3.6)	48 (8.6)	127 (22.8)	134 (24.1)	115 (20.7)	60 (10.8)	24 (4.3)	10 (1.8)	4 (0.7)	556 (100.0)	15	571	4.49	1.71
急速進行性糸球体腎炎 (%)	3 (0.8)	21 (5.3)	36 (9.1)	59 (14.9)	117 (29.6)	92 (23.3)	39 (9.9)	20 (5.1)	6 (1.5)	2 (0.5)	395 (100.0)	2	397	4.65	1.67
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	3 (0.7)	9 (2.0)	32 (7.3)	81 (18.4)	129 (29.3)	113 (25.6)	42 (9.5)	23 (5.2)	4 (0.9)	5 (1.1)	441 (100.0)	6	447	4.72	1.53
その他の分類不能の腎炎 (%)	8 (2.6)	8 (2.6)	26 (8.4)	48 (15.5)	100 (32.4)	64 (20.7)	35 (11.3)	15 (4.9)	3 (1.0)	2 (0.6)	309 (100.0)	8	317	4.59	1.71
多発性嚢胞腎 (%)	45 (2.0)	80 (3.5)	248 (10.9)	543 (23.9)	678 (29.9)	446 (19.7)	160 (7.1)	43 (1.9)	22 (1.0)	3 (0.1)	2,268 (100.0)	45	2,313	4.24	1.44
腎硬化症 (%)	77 (1.7)	177 (4.0)	457 (10.3)	1,002 (22.6)	1,224 (27.6)	857 (19.3)	427 (9.6)	155 (3.5)	42 (0.9)	24 (0.5)	4,442 (100.0)	102	4,544	4.38	1.59
悪性高血圧 (%)	11 (2.4)	6 (1.3)	34 (7.3)	93 (20.0)	142 (30.5)	112 (24.1)	52 (11.2)	8 (1.7)	6 (1.3)	1 (0.2)	465 (100.0)	9	474	4.55	1.46
糖尿病性腎症 (%)	278 (1.4)	587 (3.0)	1,928 (10.0)	4,214 (21.8)	5,568 (28.8)	3,977 (20.6)	1,853 (9.6)	639 (3.3)	197 (1.0)	96 (0.5)	19,337 (100.0)	445	19,782	4.45	1.51
SLE腎炎 (%)	14 (3.0)	18 (3.8)	46 (9.8)	79 (16.8)	118 (25.2)	109 (23.2)	51 (10.9)	26 (5.5)	7 (1.5)	1 (0.2)	469 (100.0)	11	480	4.55	1.66
アミロイド腎 (%)	5 (7.2)	3 (4.3)	7 (10.1)	14 (20.3)	11 (15.9)	18 (26.1)	7 (10.1)	2 (2.9)	1 (1.4)	1 (1.4)	69 (100.0)	1	70	4.28	2.00
痛風腎 (%)	3 (1.5)	5 (2.5)	24 (11.9)	46 (22.8)	54 (26.7)	51 (25.2)	15 (7.4)	3 (1.5)	1 (0.5)		202 (100.0)	5	207	4.30	1.38
先天性代謝異常による腎不全 (%)	1 (1.6)	2 (3.1)	5 (7.8)	13 (20.3)	18 (28.1)	11 (17.2)	6 (9.4)	3 (4.7)	2 (3.1)	3 (4.7)	64 (100.0)	2	66	4.74	1.98
腎・尿路結核 (%)	4 (10.3)	3 (7.7)		11 (28.2)	7 (17.9)	8 (20.5)	4 (10.3)	2 (5.1)			39 (100.0)	1	40	4.03	1.95
腎・尿路結石 (%)	3 (3.1)	3 (3.1)	6 (6.3)	21 (21.9)	31 (32.3)	16 (16.7)	11 (11.5)	3 (3.1)	2 (2.1)		96 (100.0)	4	100	4.49	1.55
腎・尿路腫瘍 (%)	2 (1.5)	2 (1.5)	10 (7.3)	38 (27.7)	41 (29.9)	27 (19.7)	14 (10.2)	2 (1.5)	1 (0.7)		137 (100.0)	2	139	4.35	1.32
閉塞性尿路障害 (%)	5 (3.8)	4 (3.0)	17 (12.9)	23 (17.4)	34 (25.8)	23 (17.4)	11 (8.3)	7 (5.3)	5 (3.8)	3 (2.3)	132 (100.0)		132	4.52	2.01
骨髄腫 (%)	1 (4.8)	1 (4.8)	2 (9.5)	5 (23.8)	8 (38.1)	2 (9.5)	2 (9.5)				21 (100.0)	1	22	4.05	1.41
腎形成不全 (%)	1 (0.7)	3 (2.0)	9 (5.9)	25 (16.3)	44 (28.8)	40 (26.1)	17 (11.1)	8 (5.2)	2 (1.3)	4 (2.6)	153 (100.0)		153	4.92	1.59
不明 (%)	100 (1.9)	205 (3.9)	534 (10.2)	1,073 (20.4)	1,429 (27.2)	1,076 (20.5)	544 (10.4)	188 (3.6)	70 (1.3)	34 (0.6)	5,253 (100.0)	151	5,404	4.46	1.62
再導入 (%)	3 (0.5)	22 (4.0)	42 (7.6)	106 (19.2)	142 (25.8)	131 (23.8)	65 (11.8)	27 (4.9)	11 (2.0)	2 (0.4)	551 (100.0)	13	564	4.65	1.54
その他 (%)	38 (2.8)	52 (3.8)	134 (9.7)	286 (20.8)	369 (26.8)	286 (20.8)	128 (9.3)	54 (3.9)	21 (1.5)	10 (0.7)	1,378 (100.0)	30	1,408	4.45	1.75
合計 (%)	877 (1.5)	1,796 (3.1)	5,482 (9.6)	11,937 (20.9)	16,025 (28.1)	12,128 (21.3)	5,809 (10.2)	2,016 (3.5)	672 (1.2)	288 (0.5)	57,030 (100.0)	1,300	58,330	4.49	1.55
記載なし (%)															
総計 (%)	877 (1.5)	1,796 (3.1)	5,482 (9.6)	11,937 (20.9)	16,025 (28.1)	12,128 (21.3)	5,809 (10.2)	2,016 (3.5)	672 (1.2)	288 (0.5)	57,030 (100.0)	1,300	58,330	4.49	1.55

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2423##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査