

表 945 体重減少率(%) 医療機関別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

医療機関	1.0未満	1.0~	2.0~	3.0~	4.0~	5.0~	6.0~	7.0~	8.0~	9.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	2	2	10	14	6	4	3	2			43	2	45	3.63	1.66
(%)	(4.7)	(4.7)	(23.3)	(32.6)	(14.0)	(9.3)	(7.0)	(4.7)			(100.0)				
私立大学	6	3	19	32	59	55	25	5	2	1	207	5	212	4.60	1.55
(%)	(2.9)	(1.4)	(9.2)	(15.5)	(28.5)	(26.6)	(12.1)	(2.4)	(1.0)	(0.5)	(100.0)				
国立病院機構等	1		1	8	6	7	6	3		1	33	13	46	4.98	1.77
(%)	(3.0)		(3.0)	(24.2)	(18.2)	(21.2)	(18.2)	(9.1)		(3.0)	(100.0)				
県市町村立・国保	40	69	186	446	588	438	244	68	31	7	2,117	95	2,212	4.50	1.55
(%)	(1.9)	(3.3)	(8.8)	(21.1)	(27.8)	(20.7)	(11.5)	(3.2)	(1.5)	(0.3)	(100.0)				
JCHO(旧社会保険)等	6	15	31	81	131	136	50	26	6	1	483	6	489	4.71	1.57
(%)	(1.2)	(3.1)	(6.4)	(16.8)	(27.1)	(28.2)	(10.4)	(5.4)	(1.2)	(0.2)	(100.0)				
厚生連等	22	32	66	227	355	288	147	59	24	3	1,223	68	1,291	4.72	1.53
(%)	(1.8)	(2.6)	(5.4)	(18.6)	(29.0)	(23.5)	(12.0)	(4.8)	(2.0)	(0.2)	(100.0)				
その他公的	10	30	78	174	281	207	88	33	9	6	916	65	981	4.54	1.50
(%)	(1.1)	(3.3)	(8.5)	(19.0)	(30.7)	(22.6)	(9.6)	(3.6)	(1.0)	(0.7)	(100.0)				
私立総合	17	50	130	263	307	249	116	48	9	3	1,192	45	1,237	4.41	1.52
(%)	(1.4)	(4.2)	(10.9)	(22.1)	(25.8)	(20.9)	(9.7)	(4.0)	(0.8)	(0.3)	(100.0)				
私立	296	591	1,578	3,050	3,988	3,114	1,526	564	216	74	14,997	347	15,344	4.44	1.63
(%)	(2.0)	(3.9)	(10.5)	(20.3)	(26.6)	(20.8)	(10.2)	(3.8)	(1.4)	(0.5)	(100.0)				
私立診療所	477	1,004	3,383	7,642	10,304	7,630	3,604	1,208	375	192	35,819	654	36,473	4.49	1.52
(%)	(1.3)	(2.8)	(9.4)	(21.3)	(28.8)	(21.3)	(10.1)	(3.4)	(1.0)	(0.5)	(100.0)				
総計	877	1,796	5,482	11,937	16,025	12,128	5,809	2,016	672	288	57,030	1,300	58,330	4.49	1.55
(%)	(1.5)	(3.1)	(9.6)	(20.9)	(28.1)	(21.3)	(10.2)	(3.5)	(1.2)	(0.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2424##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査