

表 962 Body Mass Index 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	14未満	14～	16～	18～	18.5～	20～	22～	24～	25～	26～	28～	30～	35～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	91 (0.4)	692 (3.3)	2,754 (13.2)	1,096 (5.3)	3,721 (17.9)	4,999 (24.1)	3,652 (17.6)	1,150 (5.5)	810 (3.9)	989 (4.8)	439 (2.1)	390 (1.9)	2 (0.0)	20,785 (100.0)	1,603	22,388	21.11	3.43
慢性腎盂腎炎 （％）	8 (1.4)	26 (4.5)	93 (16.3)	40 (7.0)	119 (20.8)	111 (19.4)	105 (18.4)	19 (3.3)	19 (3.3)	16 (2.8)	9 (1.6)	7 (1.2)		572 (100.0)	55	627	20.42	3.36
急速進行性糸球体腎炎 （％）	1 (0.2)	25 (5.6)	75 (16.9)	31 (7.0)	82 (18.5)	107 (24.1)	61 (13.7)	21 (4.7)	17 (3.8)	10 (2.3)	3 (0.7)	11 (2.5)		444 (100.0)	40	484	20.44	3.34
妊娠腎/妊娠中毒症 （％）	4 (0.9)	24 (5.5)	77 (17.8)	34 (7.9)	74 (17.1)	90 (20.8)	54 (12.5)	21 (4.8)	17 (3.9)	17 (3.9)	8 (1.8)	13 (3.0)		433 (100.0)	26	459	20.59	3.78
その他の分類不能の腎炎 （％）	3 (0.9)	13 (4.0)	40 (12.2)	22 (6.7)	63 (19.3)	80 (24.5)	44 (13.5)	22 (6.7)	12 (3.7)	18 (5.5)	5 (1.5)	4 (1.2)	1 (0.3)	327 (100.0)	28	355	20.93	3.46
多発性嚢胞腎 （％）	2 (0.1)	45 (1.9)	207 (8.7)	96 (4.0)	433 (18.2)	623 (26.2)	506 (21.3)	166 (7.0)	106 (4.5)	108 (4.5)	45 (1.9)	42 (1.8)		2,379 (100.0)	190	2,569	21.53	3.16
腎硬化症 （％）	29 (0.5)	157 (2.9)	571 (10.7)	219 (4.1)	808 (15.1)	1,295 (24.2)	1,024 (19.1)	334 (6.2)	244 (4.6)	337 (6.3)	193 (3.6)	138 (2.6)		5,349 (100.0)	547	5,896	21.68	3.64
悪性高血圧 （％）	2 (0.4)	13 (2.5)	35 (6.7)	24 (4.6)	55 (10.6)	112 (21.5)	94 (18.0)	41 (7.9)	33 (6.3)	35 (6.7)	38 (7.3)	39 (7.5)		521 (100.0)	34	555	22.90	4.21
糖尿病性腎症 （％）	56 (0.3)	355 (1.6)	1,440 (6.5)	664 (3.0)	2,686 (12.1)	4,568 (20.5)	4,484 (20.1)	1,928 (8.7)	1,530 (6.9)	2,081 (9.3)	1,236 (5.6)	1,227 (5.5)	12 (0.1)	22,267 (100.0)	2,249	24,516	22.92	3.90
SLE腎炎 （％）	3 (0.6)	31 (6.3)	91 (18.4)	27 (5.5)	127 (25.7)	100 (20.2)	57 (11.5)	12 (2.4)	14 (2.8)	17 (3.4)	7 (1.4)	9 (1.8)		495 (100.0)	42	537	20.15	3.43
アミロイド腎 （％）		6 (6.7)	19 (21.1)	5 (5.6)	20 (22.2)	19 (21.1)	7 (7.8)	3 (3.3)	3 (3.3)	6 (6.7)	2 (2.2)			90 (100.0)	8	98	20.23	3.37
痛風腎 （％）	1 (0.5)	5 (2.4)	27 (12.7)	9 (4.2)	30 (14.2)	51 (24.1)	38 (17.9)	15 (7.1)	10 (4.7)	15 (7.1)	5 (2.4)	6 (2.8)		212 (100.0)	15	227	21.64	3.63
先天性代謝異常による腎不全 （％）		3 (4.7)	11 (17.2)	4 (6.3)	11 (17.2)	14 (21.9)	10 (15.6)	1 (1.6)	2 (3.1)	3 (4.7)		5 (7.8)		64 (100.0)	9	73	21.11	4.10
腎・尿路結核 （％）	1 (2.4)	3 (7.3)	7 (17.1)	2 (4.9)	6 (14.6)	9 (22.0)	7 (17.1)	2 (4.9)		3 (7.3)		1 (2.4)		41 (100.0)	3	44	20.45	3.85
腎・尿路結石 （％）	1 (1.0)	8 (7.8)	6 (5.8)	4 (3.9)	13 (12.6)	25 (24.3)	21 (20.4)	8 (7.8)	7 (6.8)	10 (9.7)				103 (100.0)	10	113	21.38	3.39
腎・尿路腫瘍 （％）		2 (1.1)	17 (9.7)	6 (3.4)	40 (22.7)	35 (19.9)	39 (22.2)	16 (9.1)	9 (5.1)	7 (4.0)	4 (2.3)	1 (0.6)		176 (100.0)	14	190	21.49	3.11
閉塞性尿路障害 （％）		4 (2.7)	21 (14.3)	7 (4.8)	24 (16.3)	34 (23.1)	30 (20.4)	8 (5.4)	5 (3.4)	9 (6.1)	2 (1.4)	3 (2.0)		147 (100.0)	4	151	21.26	3.45
骨髄腫 （％）			5 (15.6)	2 (6.3)	9 (28.1)	5 (15.6)	8 (25.0)		2 (6.3)	1 (3.1)				32 (100.0)	5	37	20.70	2.93
腎形成不全 （％）		6 (3.6)	22 (13.2)	9 (5.4)	29 (17.4)	36 (21.6)	32 (19.2)	10 (6.0)	9 (5.4)	7 (4.2)	3 (1.8)	4 (2.4)		167 (100.0)	4	171	21.24	3.58
不明 （％）	33 (0.6)	209 (3.5)	697 (11.7)	290 (4.9)	992 (16.7)	1,347 (22.7)	1,057 (17.8)	355 (6.0)	251 (4.2)	351 (5.9)	203 (3.4)	161 (2.7)		5,946 (100.0)	585	6,531	21.48	3.71
再導入 （％）	4 (0.7)	23 (3.9)	87 (14.6)	41 (6.9)	92 (15.5)	163 (27.4)	89 (15.0)	20 (3.4)	24 (4.0)	28 (4.7)	18 (3.0)	6 (1.0)		595 (100.0)	38	633	20.86	3.41
その他 （％）	8 (0.5)	67 (4.3)	173 (11.2)	94 (6.1)	240 (15.6)	364 (23.6)	269 (17.4)	80 (5.2)	61 (4.0)	91 (5.9)	56 (3.6)	40 (2.6)		1,543 (100.0)	177	1,720	21.39	3.75
合計 （％）	247 (0.4)	1,717 (2.7)	6,475 (10.3)	2,726 (4.3)	9,674 (15.4)	14,187 (22.6)	11,688 (18.6)	4,232 (6.8)	3,185 (5.1)	4,159 (6.6)	2,276 (3.6)	2,107 (3.4)	15 (0.0)	62,688 (100.0)	5,686	68,374	21.85	3.75
記載なし （％）																		
総計 （％）	247 (0.4)	1,717 (2.7)	6,475 (10.3)	2,726 (4.3)	9,674 (15.4)	14,187 (22.6)	11,688 (18.6)	4,232 (6.8)	3,185 (5.1)	4,159 (6.6)	2,276 (3.6)	2,107 (3.4)	15 (0.0)	62,688 (100.0)	5,686	68,374	21.85	3.75

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

##D2533##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査