

表 967 Body Mass Index 原疾患別(腹膜透析患者)

原疾患	14未満	14~	16~	18~	18.5~	20~	22~	24~	25~	26~	28~	30~	35~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差		
慢性系球体腎炎	8 (%)	12 (0.5)	72 (0.7)	43 (4.2)	175 (2.5)	423 (10.3)	424 (24.9)	164 (24.9)	125 (9.6)	150 (7.3)	66 (8.8)	40 (3.9)		1,702 (2.4)	964 (100.0)	2,666 (100.0)	22.71	3.26		
慢性腎盂腎炎	1 (%)	5 (1.5)	5 (7.4)	2 (7.4)	13 (2.9)	15 (19.1)	12 (22.1)	5 (17.6)	2 (7.4)	4 (2.9)	1 (5.9)	3 (1.5)	3 (4.4)		68 (100.0)	29 (100.0)	97 (100.0)	21.35	4.00	
急速進行性系球体腎炎				7 (17.5)	5 (12.5)	12 (30.0)	8 (20.0)	2 (5.0)	1 (2.5)	4 (10.0)	1 (2.5)			40 (100.0)	21 (100.0)	61 (100.0)	21.46	3.15		
妊娠腎/妊娠中毒症	1 (%)	3 (5.6)	2 (16.7)	2 (11.1)	2 (11.1)	1 (11.1)	1 (5.6)		3 (16.7)	2 (11.1)	2 (11.1)	2 (11.1)		18 (100.0)	6 (100.0)	24 (100.0)	22.20	5.86		
その他の分類不能の腎炎				5 (9.3)	7 (13.0)	2 (3.7)	11 (20.4)	12 (22.2)	6 (11.1)	2 (3.7)	5 (9.3)	1 (1.9)	3 (5.6)		54 (100.0)	21 (100.0)	75 (100.0)	21.09	4.25	
多発性囊胞腎				4 (2.4)	7 (4.2)	3 (1.8)	21 (12.7)	36 (21.8)	37 (22.4)	18 (10.9)	11 (6.7)	18 (10.9)	5 (3.0)	5 (3.0)	165 (100.0)	107 (100.0)	272 (100.0)	22.79	3.44	
腎硬化症				5 (0.7)	27 (3.9)	14 (2.0)	58 (8.4)	154 (22.3)	158 (22.9)	85 (12.3)	50 (7.2)	69 (10.0)	29 (4.2)	40 (5.8)	1 (0.1)	690 (100.0)	416 (100.0)	1,106 (100.0)	23.37	3.57
悪性高血圧				2 (3.3)	2 (3.3)	5 (8.2)	18 (29.5)	10 (16.4)	6 (9.8)	1 (1.6)	8 (13.1)	5 (8.2)	4 (6.6)		61 (100.0)	45 (100.0)	106 (100.0)	23.55	4.01	
糖尿病性腎症				2 (0.1)	25 (1.5)	21 (1.2)	118 (6.9)	270 (15.9)	385 (22.7)	209 (12.3)	178 (10.5)	226 (13.3)	151 (8.9)	111 (6.5)	2 (0.1)	1,698 (100.0)	1,048 (100.0)	2,746 (100.0)	24.33	3.48
SLE腎炎				2 (7.1)	2 (7.1)	1 (3.6)	6 (21.4)	3 (10.7)	3 (10.7)	4 (14.3)	1 (3.6)	3 (10.7)	3 (10.7)		28 (100.0)	27 (100.0)	55 (100.0)	22.04	4.08	
アミロイド腎				1 (10.0)		1 (10.0)	4 (40.0)	1 (10.0)	2 (20.0)	1 (10.0)					10 (100.0)	6 (100.0)	16 (100.0)	21.67	2.53	
痛風腎				1 (7.7)		2 (7.7)	3 (15.4)	1 (23.1)	2 (7.7)	2 (15.4)	2 (15.4)	1 (7.7)	1 (7.7)		13 (100.0)	10 (100.0)	23 (100.0)	23.31	3.25	
先天性代謝異常による腎不全	2 (%)	3 (15.4)	2 (23.1)	1 (15.4)	1 (7.7)	1 (7.7)	1 (7.7)	1 (7.7)		1 (7.7)	1 (7.7)	1 (7.7)	1 (7.7)		13 (100.0)	4 (100.0)	17 (100.0)	19.54	6.58	
腎・尿路結核															1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)			
腎・尿路結石				1 (6.7)		2 (6.7)	5 (13.3)	2 (33.3)	1 (13.3)	1 (6.7)	1 (6.7)	2 (6.7)	2 (6.7)		15 (100.0)	6 (100.0)	21 (100.0)	23.71	3.95	
腎・尿路腫瘍															9 (100.0)	3 (100.0)	12 (100.0)	25.80	1.76	
閉塞性尿路障害	1 (%)				1 (9.1)	2 (9.1)	1 (18.2)	1 (9.1)	3 (27.3)	1 (9.1)	1 (9.1)	1 (9.1)	1 (9.1)		11 (100.0)	9 (100.0)	20 (100.0)	21.55	3.84	
骨髄腫				1 (20.0)		2 (40.0)	1 (20.0)	1 (20.0)						5 (100.0)	2 (100.0)	7 (100.0)	19.60	2.22		
腎形成不全	6 (%)	5 (14.0)	10 (11.6)	1 (23.3)	5 (2.3)	5 (11.6)	5 (11.6)	1 (2.3)	2 (4.7)	1 (2.3)	2 (4.7)	1 (2.3)	4 (9.3)		43 (100.0)	22 (100.0)	65 (100.0)	19.55	5.78	
不明	3 (%)	8 (0.6)	19 (1.6)	18 (3.8)	50 (3.6)	107 (10.0)	117 (21.4)	45 (23.4)	38 (9.0)	49 (7.6)	24 (9.8)	21 (4.8)	1 (4.2)	500 (0.2)	389 (100.0)	889 (100.0)	22.97	3.67		
再導入				6 (16.2)		9 (24.3)	10 (27.0)	6 (16.2)	2 (5.4)	1 (2.7)	2 (5.4)	1 (2.7)	1 (2.7)		37 (100.0)	28 (100.0)	65 (100.0)	21.34	3.38	
その他	8 (%)	8 (5.1)	22 (5.1)	5 (14.1)	12 (3.2)	28 (7.7)	28 (17.9)	28 (17.9)	12 (7.7)	12 (7.7)	11 (7.1)	6 (3.8)	4 (2.6)	156 (100.0)	115 (100.0)	271 (100.0)	21.41	4.38		
合計	30 (%)	62 (0.6)	217 (1.2)	115 (4.1)	498 (2.2)	1,106 (9.3)	1,211 (20.7)	562 (22.7)	432 (10.5)	560 (8.1)	298 (10.5)	241 (5.6)	4 (4.5)	5,336 (0.1)	3,279 (100.0)	8,615 (100.0)	23.22	3.65		
記載なし																				
総計	30 (%)	62 (0.6)	217 (1.2)	115 (4.1)	498 (2.2)	1,106 (9.3)	1,211 (20.7)	562 (22.7)	432 (10.5)	560 (8.1)	298 (10.5)	241 (5.6)	4 (4.5)	5,336 (0.1)	3,279 (100.0)	8,615 (100.0)	23.22	3.65		

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D2543##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査