

表 969 透析前BUN(mg/dL) 性別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

性別	20未満	20~	30~	40~	50~	60~	70~	80~	90~	100~	110~	120~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	247 (0.2)	1,573 (1.6)	6,310 (6.3)	16,314 (16.4)	25,241 (25.3)	24,744 (24.8)	15,144 (15.2)	6,817 (6.8)	2,287 (2.3)	646 (0.6)	179 (0.2)	86 (0.1)	99,588 (100.0)	2,902 (100.0)	102,490 (100.0)	60.00	15.29
女性 (%)	219 (0.4)	1,217 (2.1)	4,059 (7.1)	9,553 (16.8)	14,036 (24.6)	13,425 (23.6)	8,561 (15.0)	3,958 (6.9)	1,411 (2.5)	395 (0.7)	115 (0.2)	49 (0.1)	56,998 (100.0)	1,645 (100.0)	58,643 (100.0)	59.57	15.90
合計 (%)	466 (0.3)	2,790 (1.8)	10,369 (6.6)	25,867 (16.5)	39,277 (25.1)	38,169 (24.4)	23,705 (15.1)	10,775 (6.9)	3,698 (2.4)	1,041 (0.7)	294 (0.2)	135 (0.1)	156,586 (100.0)	4,547 (100.0)	161,133 (100.0)	59.84	15.51
記載なし (%)																	
総計 (%)	466 (0.3)	2,790 (1.8)	10,369 (6.6)	25,867 (16.5)	39,277 (25.1)	38,169 (24.4)	23,705 (15.1)	10,775 (6.9)	3,698 (2.4)	1,041 (0.7)	294 (0.2)	135 (0.1)	156,586 (100.0)	4,547 (100.0)	161,133 (100.0)	59.84	15.51

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D2610##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査