

表 977 透析前BUN(mg/dL) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

原疾患	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	25 (0.1)	130 (0.6)	795 (3.9)	2,533 (12.5)	4,912 (24.3)	5,483 (27.1)	3,823 (18.9)	1,726 (8.5)	596 (2.9)	164 (0.8)	32 (0.2)	21 (0.1)	20,240 (100.0)	460	20,700	63.05	14.63
慢性腎盂腎炎 (%)		9 (1.6)	25 (4.5)	77 (13.8)	144 (25.9)	142 (25.5)	98 (17.6)	40 (7.2)	12 (2.2)	5 (0.9)	3 (0.5)	1 (0.2)	556 (100.0)	15	571	61.64	15.23
急速進行性糸球体腎炎 (%)	2 (0.5)	4 (1.0)	21 (5.3)	50 (12.7)	87 (22.0)	107 (27.1)	68 (17.2)	37 (9.4)	13 (3.3)	6 (1.5)			395 (100.0)	2	397	63.08	15.97
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	1 (0.2)	3 (0.7)	23 (5.2)	57 (12.9)	111 (25.2)	114 (25.9)	73 (16.6)	35 (7.9)	17 (3.9)	5 (1.1)	2 (0.5)		441 (100.0)	6	447	62.56	15.47
その他の分類不能の腎炎 (%)		4 (1.3)	15 (4.9)	48 (15.6)	63 (20.5)	73 (23.8)	60 (19.5)	34 (11.1)	9 (2.9)	1 (0.3)			307 (100.0)	10	317	62.52	15.17
多発性嚢胞腎 (%)	4 (0.2)	20 (0.9)	96 (4.2)	270 (11.9)	583 (25.7)	607 (26.7)	445 (19.6)	183 (8.1)	47 (2.1)	11 (0.5)	3 (0.1)	2 (0.1)	2,271 (100.0)	42	2,313	62.39	14.22
腎硬化症 (%)	4 (0.1)	46 (1.0)	247 (5.6)	699 (15.7)	1,158 (26.0)	1,110 (25.0)	726 (16.3)	297 (6.7)	117 (2.6)	33 (0.7)	7 (0.2)	2 (0.0)	4,446 (100.0)	98	4,544	60.83	14.91
悪性高血圧 (%)		2 (0.4)	22 (4.7)	68 (14.7)	110 (23.7)	124 (26.7)	81 (17.5)	30 (6.5)	18 (3.9)	8 (1.7)	1 (0.2)		464 (100.0)	10	474	62.80	15.15
糖尿病性腎症 (%)	42 (0.2)	278 (1.4)	1,368 (7.1)	3,455 (17.9)	5,181 (26.8)	4,629 (24.0)	2,682 (13.9)	1,164 (6.0)	373 (1.9)	114 (0.6)	30 (0.2)	11 (0.1)	19,327 (100.0)	455	19,782	58.92	14.95
SLE腎炎 (%)		4 (0.9)	20 (4.3)	64 (13.7)	109 (23.4)	107 (23.0)	89 (19.1)	47 (10.1)	16 (3.4)	5 (1.1)	3 (0.6)	2 (0.4)	466 (100.0)	14	480	63.91	17.29
アミロイド腎 (%)		2 (3.0)	3 (4.5)	14 (20.9)	19 (28.4)	12 (17.9)	12 (17.9)	5 (7.5)					67 (100.0)	3	70	58.63	14.07
痛風腎 (%)	2 (1.0)	2 (1.0)	12 (5.9)	27 (13.2)	52 (25.4)	47 (22.9)	44 (21.5)	15 (7.3)	1 (0.5)	3 (1.5)			205 (100.0)	2	207	60.93	15.13
先天性代謝異常による腎不全 (%)			3 (4.7)	6 (9.4)	9 (14.1)	17 (26.6)	20 (31.3)	4 (6.3)	3 (4.7)	1 (1.6)		1 (1.6)	64 (100.0)	2	66	67.11	17.12
腎・尿路結核 (%)		2 (5.1)	2 (5.1)	5 (12.8)	8 (20.5)	9 (23.1)	8 (20.5)	5 (12.8)					39 (100.0)	1	40	60.74	17.28
腎・尿路結石 (%)			3 (3.2)	14 (14.7)	30 (31.6)	22 (23.2)	17 (17.9)	5 (5.3)	1 (1.1)	1 (1.1)	2 (2.1)		95 (100.0)	5	100	61.78	15.37
腎・尿路腫瘍 (%)	1 (0.7)		9 (6.7)	23 (17.0)	27 (20.0)	40 (29.6)	20 (14.8)	9 (6.7)	4 (3.0)	2 (1.5)			135 (100.0)	4	139	61.02	15.82
閉塞性尿路障害 (%)		1 (0.8)	9 (6.9)	20 (15.3)	30 (22.9)	36 (27.5)	17 (13.0)	16 (12.2)	2 (1.5)				131 (100.0)	1	132	61.31	14.58
骨髄腫 (%)			2 (9.5)	2 (9.5)	5 (23.8)	5 (23.8)	1 (4.8)	2 (9.5)	4 (19.0)				21 (100.0)	1	22	65.81	20.26
腎形成不全 (%)			2 (1.3)	21 (14.0)	29 (19.3)	34 (22.7)	38 (25.3)	15 (10.0)	7 (4.7)	3 (2.0)		1 (0.7)	150 (100.0)	3	153	66.50	15.48
不明 (%)	10 (0.2)	62 (1.2)	276 (5.3)	791 (15.1)	1,238 (23.6)	1,308 (24.9)	901 (17.2)	424 (8.1)	168 (3.2)	50 (1.0)	11 (0.2)	6 (0.1)	5,245 (100.0)	159	5,404	61.81	15.66
再導入 (%)			23 (4.2)	41 (7.4)	126 (22.9)	153 (27.8)	114 (20.7)	67 (12.2)	19 (3.4)	6 (1.1)	2 (0.4)		551 (100.0)	13	564	65.71	14.39
その他 (%)	1 (0.1)	15 (1.1)	85 (6.2)	173 (12.6)	339 (24.7)	331 (24.1)	262 (19.1)	114 (8.3)	46 (3.3)	6 (0.4)	1 (0.1)	2 (0.1)	1,375 (100.0)	33	1,408	62.13	15.27
合計 (%)	92 (0.2)	584 (1.0)	3,061 (5.4)	8,458 (14.8)	14,370 (25.2)	14,510 (25.5)	9,599 (16.8)	4,274 (7.5)	1,473 (2.6)	424 (0.7)	97 (0.2)	49 (0.1)	56,991 (100.0)	1,339	58,330	61.31	15.04
記載なし (%)																	
総計 (%)	92 (0.2)	584 (1.0)	3,061 (5.4)	8,458 (14.8)	14,370 (25.2)	14,510 (25.5)	9,599 (16.8)	4,274 (7.5)	1,473 (2.6)	424 (0.7)	97 (0.2)	49 (0.1)	56,991 (100.0)	1,339	58,330	61.31	15.04

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2623##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査