

表 979 BUN(mg/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	13	77	404	791	1,024	773	416	183	54	21	4	6	3,766	1,836	5,602	56.36	15.71
(%)	(0.3)	(2.0)	(10.7)	(21.0)	(27.2)	(20.5)	(11.0)	(4.9)	(1.4)	(0.6)	(0.1)	(0.2)	(100.0)				
女性	5	79	285	510	536	344	160	70	22	5	2	1	2,019	994	3,013	52.90	14.89
(%)	(0.2)	(3.9)	(14.1)	(25.3)	(26.5)	(17.0)	(7.9)	(3.5)	(1.1)	(0.2)	(0.1)	(0.0)	(100.0)				
合計	18	156	689	1,301	1,560	1,117	576	253	76	26	6	7	5,785	2,830	8,615	55.15	15.51
(%)	(0.3)	(2.7)	(11.9)	(22.5)	(27.0)	(19.3)	(10.0)	(4.4)	(1.3)	(0.4)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				
記載なし																	
(%)																	
総計	18	156	689	1,301	1,560	1,117	576	253	76	26	6	7	5,785	2,830	8,615	55.15	15.51
(%)	(0.3)	(2.7)	(11.9)	(22.5)	(27.0)	(19.3)	(10.0)	(4.4)	(1.3)	(0.4)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
##D2630##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査