

表 982 BUN(mg/dL) 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	1 (0.1)	37 (2.0)	174 (9.5)	392 (21.5)	498 (27.3)	389 (21.3)	210 (11.5)	89 (4.9)	20 (1.1)	11 (0.6)	1 (0.1)	2 (0.1)	1,824 (100.0)	842	2,666	56.63	15.12
慢性腎盂腎炎 (%)	1 (1.4)	5 (6.8)	10 (13.5)	14 (18.9)	17 (23.0)	15 (20.3)	5 (6.8)	6 (8.1)	1 (1.4)				74 (100.0)	23	97	53.50	16.82
急速進行性糸球体腎炎 (%)		4 (8.9)	6 (13.3)	10 (22.2)	7 (15.6)	8 (17.8)	6 (13.3)	3 (6.7)	1 (2.2)				45 (100.0)	16	61	54.56	18.69
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)		1 (5.0)	3 (15.0)	4 (20.0)	8 (40.0)	3 (15.0)	1 (5.0)						20 (100.0)	4	24	50.70	10.96
その他の分類不能の腎炎 (%)		1 (1.9)	8 (15.1)	10 (18.9)	11 (20.8)	12 (22.6)	6 (11.3)	4 (7.5)				1 (1.9)	53 (100.0)	22	75	57.70	18.54
多発性嚢胞腎 (%)		3 (1.7)	21 (11.6)	32 (17.7)	47 (26.0)	39 (21.5)	22 (12.2)	11 (6.1)	4 (2.2)	1 (0.6)		1 (0.6)	181 (100.0)	91	272	57.71	16.22
腎硬化症 (%)	1 (0.1)	13 (1.7)	95 (12.6)	183 (24.4)	205 (27.3)	140 (18.6)	69 (9.2)	30 (4.0)	13 (1.7)	2 (0.3)			751 (100.0)	355	1,106	54.72	14.69
悪性高血圧 (%)	1 (1.4)	3 (4.3)	6 (8.7)	14 (20.3)	20 (29.0)	8 (11.6)	7 (10.1)	9 (13.0)	1 (1.4)				69 (100.0)	37	106	55.71	17.48
糖尿病性腎症 (%)	10 (0.5)	52 (2.8)	260 (14.2)	434 (23.7)	521 (28.5)	302 (16.5)	157 (8.6)	62 (3.4)	19 (1.0)	8 (0.4)	1 (0.1)	3 (0.2)	1,829 (100.0)	917	2,746	53.52	15.51
SLE腎炎 (%)		3 (9.4)	2 (6.3)	8 (25.0)	9 (28.1)	5 (15.6)	2 (6.3)	2 (6.3)	1 (3.1)				32 (100.0)	23	55	53.81	15.95
アミロイド腎 (%)			2 (16.7)	2 (16.7)	2 (16.7)	2 (16.7)	3 (25.0)				1 (8.3)		12 (100.0)	4	16	61.08	20.65
痛風腎 (%)			3 (18.8)	5 (31.3)	1 (6.3)	3 (18.8)	4 (25.0)						16 (100.0)	7	23	54.25	16.56
先天性代謝異常による腎不全 (%)		1 (7.7)	1 (7.7)	1 (7.7)	5 (38.5)	2 (15.4)	2 (15.4)		1 (7.7)				13 (100.0)	4	17	58.00	17.26
腎・尿路結核 (%)														1	1		
腎・尿路結石 (%)			2 (12.5)	2 (12.5)	3 (18.8)	6 (37.5)	1 (6.3)	2 (12.5)					16 (100.0)	5	21	60.25	15.20
腎・尿路腫瘍 (%)		1 (12.5)	1 (12.5)	1 (12.5)	2 (25.0)	2 (25.0)			1 (12.5)				8 (100.0)	4	12	55.63	21.67
閉塞性尿路障害 (%)		1 (8.3)		2 (16.7)	4 (33.3)	3 (25.0)	2 (16.7)						12 (100.0)	8	20	56.75	14.01
骨髄腫 (%)		1 (20.0)	2 (40.0)		1 (20.0)		1 (20.0)						5 (100.0)	2	7	46.80	20.30
腎形成不全 (%)		2 (4.7)	1 (2.3)	11 (25.6)	8 (18.6)	11 (25.6)	6 (14.0)	3 (7.0)	1 (2.3)				43 (100.0)	22	65	57.86	15.59
不明 (%)	3 (0.5)	21 (3.7)	66 (11.6)	120 (21.1)	152 (26.8)	115 (20.2)	53 (9.3)	25 (4.4)	8 (1.4)	3 (0.5)	2 (0.4)		568 (100.0)	321	889	55.07	15.76
再導入 (%)			5 (10.2)	9 (18.4)	11 (22.4)	16 (32.7)	4 (8.2)	2 (4.1)	1 (2.0)		1 (2.0)		49 (100.0)	16	65	59.39	15.16
その他 (%)	1 (0.6)	7 (4.2)	21 (12.7)	47 (28.5)	28 (17.0)	36 (21.8)	15 (9.1)	5 (3.0)	4 (2.4)	1 (0.6)			165 (100.0)	106	271	54.02	16.11
合計 (%)	18 (0.3)	156 (2.7)	689 (11.9)	1,301 (22.5)	1,560 (27.0)	1,117 (19.3)	576 (10.0)	253 (4.4)	76 (1.3)	26 (0.4)	6 (0.1)	7 (0.1)	5,785 (100.0)	2,830	8,615	55.15	15.51
記載なし (%)																	
総計 (%)	18 (0.3)	156 (2.7)	689 (11.9)	1,301 (22.5)	1,560 (27.0)	1,117 (19.3)	576 (10.0)	253 (4.4)	76 (1.3)	26 (0.4)	6 (0.1)	7 (0.1)	5,785 (100.0)	2,830	8,615	55.15	15.51

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

##D2633##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査