

表 984 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 性別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

性別	2未満	2~	4~	6~	8~	10~	12~	14~	16~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	30 (%)	664 (0.7)	3,308 (3.3)	10,672 (10.7)	22,801 (22.9)	28,718 (28.8)	20,987 (21.1)	9,256 (9.3)	3,129 (3.1)	99,565 (100.0)	2,925	102,490	10.81	2.78
女性	40 (%)	966 (1.7)	4,534 (8.0)	12,816 (22.5)	19,799 (34.8)	13,464 (23.6)	4,497 (7.9)	740 (1.3)	110 (0.2)	56,966 (100.0)	1,677	58,643	8.96	2.34
合計	70 (%)	1,630 (1.0)	7,842 (5.0)	23,488 (15.0)	42,600 (27.2)	42,182 (26.9)	25,484 (16.3)	9,996 (6.4)	3,239 (2.1)	156,531 (100.0)	4,602	161,133	10.14	2.78
記載なし														
総計	70 (%)	1,630 (1.0)	7,842 (5.0)	23,488 (15.0)	42,600 (27.2)	42,182 (26.9)	25,484 (16.3)	9,996 (6.4)	3,239 (2.1)	156,531 (100.0)	4,602	161,133	10.14	2.78

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2710##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査