

表 985 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

年齢	2未満	2~	4~	6~	8~	10~	12~	14~	16~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)		1 (33.3)	3 (0.3)	5 (1.0)	21 (1.7)	53 (7.3)	69 (18.5)	84 (24.1)	50 (29.4)	3 (33.3)	286 (100.0)	14 (100.0)	300 (100.0)	8.97 5.75
15歳~ (%)		1 (0.3)	3 (1.0)	5 (1.7)	21 (7.3)	53 (18.5)	69 (24.1)	84 (29.4)	50 (29.4)	1 (33.3)	286 (100.0)	14 (100.0)	300 (100.0)	13.54 2.85
30歳~ (%)		20 (0.4)	56 (1.0)	142 (2.5)	473 (8.5)	1,070 (19.2)	1,587 (28.5)	1,368 (24.5)	862 (15.5)	5,578 (100.0)	175 (100.0)	5,753 (100.0)	13.16 2.86	
45歳~ (%)	4 (0.0)	78 (0.3)	394 (0.3)	1,362 (1.5)	3,963 (5.2)	7,258 (15.1)	7,443 (27.7)	4,128 (28.4)	1,540 (15.8)	26,170 (5.9)	783 (100.0)	26,953 (100.0)	11.90 2.70	
60歳~ (%)	22 (0.0)	498 (0.7)	2,441 (3.4)	8,395 (11.8)	19,517 (11.8)	22,622 (27.4)	13,046 (31.8)	3,856 (18.3)	716 (5.4)	71,113 (1.0)	2,077 (100.0)	73,190 (100.0)	10.32 2.47	
75歳~ (%)	38 (0.1)	907 (1.8)	4,381 (8.7)	12,366 (24.6)	17,690 (35.2)	10,900 (21.7)	3,306 (6.6)	555 (1.1)	69 (0.1)	50,212 (0.1)	1,464 (100.0)	51,676 (100.0)	8.78 2.30	
90歳~ (%)	6 (0.2)	125 (3.9)	567 (17.9)	1,218 (38.4)	935 (29.5)	279 (8.8)	33 (1.0)	4 (0.1)	2 (0.1)	3,169 (0.1)	89 (100.0)	3,258 (100.0)	7.48 2.17	
合計 (%)	70 (0.0)	1,630 (1.0)	7,842 (5.0)	23,488 (15.0)	42,600 (27.2)	42,182 (26.9)	25,484 (16.3)	9,996 (6.4)	3,239 (6.4)	156,531 (2.1)	4,602 (100.0)	161,133 (100.0)	10.14 2.78	
不明 (%)														
記載なし (%)														
総計 (%)	70 (0.0)	1,630 (1.0)	7,842 (5.0)	23,488 (15.0)	42,600 (27.2)	42,182 (26.9)	25,484 (16.3)	9,996 (6.4)	3,239 (6.4)	156,531 (2.1)	4,602 (100.0)	161,133 (100.0)	10.14 2.78	
平均	76.60	76.59	76.71	75.45	72.13	67.59	62.54	57.08	51.44	68.73	68.58	68.73		
標準偏差	11.52	10.79	10.24	10.00	10.12	10.53	11.07	11.47	11.21	12.06	12.28	12.07		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2711##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査