

表987 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 原疾患別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

原疾患	2未満	2~	4~	6~	8~	10~	12~	14~	16~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性系球体腎炎	15 (%) (0.0)	334 (0.7) (3.4)	1,644 (11.3) (24.8)	5,406 (22.8) (28.4)	11,892 (19.4) (28.8)	13,817 (8.6) (28.8)	9,277 (2.9) (100.0)	4,110 (1.8) (100.0)	1,407 (1.8) (100.0)	47,902 (100.0)	1,331 (100.0)	49,233 (100.0)	10.66 (100.0)	2.77 (100.0)
慢性腎盂腎炎	1 (%) (0.1)	13 (0.9) (4.1)	62 (14.6) (28.1)	222 (26.3) (28.3)	429 (16.5) (23.7)	401 (7.6) (13.2)	252 (1.8) (100.0)	116 (1.8) (100.0)	28 (1.8) (100.0)	1,524 (100.0)	29 (100.0)	1,553 (100.0)	10.22 (100.0)	2.73 (100.0)
急速進行性系球体腎炎	7 (%) (0.6)	55 (4.7) (9.0)	105 (16.4) (26.2)	192 (26.2) (23.7)	306 (13.2) (13.2)	277 (4.4) (13.2)	155 (1.8) (100.0)	52 (1.8) (100.0)	21 (1.8) (100.0)	1,170 (100.0)	41 (100.0)	1,211 (100.0)	9.36 (100.0)	3.11 (100.0)
妊娠腎/妊娠中毒症		4 (%) (0.5)	15 (1.9) (15.8)	125 (32.3) (32.7)	256 (32.7) (14.4)	259 (14.4) (1.9)	114 (1.9) (0.6)	15 (0.6) (100.0)	5 (100.0)	793 (100.0)	17 (100.0)	810 (100.0)	9.93 (100.0)	2.13 (100.0)
その他の分類不能の腎炎	1 (%) (0.1)	9 (1.3) (3.8)	26 (10.9) (20.4)	75 (20.4) (26.7)	140 (26.7) (21.4)	183 (21.4) (11.2)	147 (11.2) (4.1)	77 (4.1) (100.0)	28 (100.0)	686 (100.0)	23 (100.0)	709 (100.0)	10.91 (100.0)	3.00 (100.0)
多発性囊胞腎		28 (%) (0.5)	142 (2.3) (11.4)	693 (11.4) (26.6)	1,617 (26.6) (30.0)	1,823 (30.0) (19.3)	1,173 (19.3) (7.4)	450 (7.4) (2.4)	147 (2.4) (100.0)	6,073 (100.0)	164 (100.0)	6,237 (100.0)	10.62 (100.0)	2.56 (100.0)
腎硬化症	4 (%) (0.0)	174 (1.2) (5.9)	840 (5.9) (17.7)	2,543 (17.7) (29.3)	4,200 (29.3) (25.0)	3,583 (25.0) (13.9)	1,990 (13.9) (5.2)	748 (5.2) (1.8)	259 (1.8) (100.0)	14,341 (100.0)	350 (100.0)	14,691 (100.0)	9.81 (100.0)	2.75 (100.0)
悪性高血圧	2 (%) (0.2)	14 (1.1) (4.7)	61 (12.4) (21.7)	162 (21.7) (24.3)	284 (24.3) (20.3)	319 (20.3) (10.8)	266 (10.8) (4.7)	141 (4.7) (100.0)	62 (100.0)	1,311 (100.0)	58 (100.0)	1,369 (100.0)	10.81 (100.0)	3.11 (100.0)
糖尿病性腎症	12 (%) (0.0)	675 (1.1) (6.0)	3,614 (6.0) (17.5)	10,575 (17.5) (29.2)	17,674 (29.2) (26.3)	15,900 (26.3) (14.2)	8,580 (14.2) (4.5)	2,741 (4.5) (1.2)	697 (1.2) (100.0)	60,468 (100.0)	1,769 (100.0)	62,237 (100.0)	9.76 (100.0)	2.66 (100.0)
SLE腎炎	5 (%) (0.5)	16 (1.5) (5.7)	60 (5.7) (17.1)	181 (17.1) (30.1)	318 (30.1) (27.6)	292 (27.6) (12.9)	136 (12.9) (3.3)	35 (3.3) (1.4)	15 (1.4) (100.0)	1,058 (100.0)	37 (100.0)	1,095 (100.0)	9.62 (100.0)	2.61 (100.0)
アミロイド腎	6 (%) (3.2)	26 (13.8) (19.6)	37 (19.6) (29.6)	56 (29.6) (19.0)	36 (19.0) (10.1)	19 (10.1) (3.7)	7 (3.7) (1.1)	2 (1.1) (100.0)	189 (100.0)	7 (100.0)	196 (100.0)	8.95 (100.0)	2.95 (100.0)	
痛風腎	6 (%) (1.0)	9 (1.6) (9.5)	55 (9.5) (18.3)	106 (18.3) (32.0)	185 (32.0) (23.4)	135 (23.4) (11.1)	64 (11.1) (3.1)	18 (3.1) (100.0)	578 (100.0)	19 (100.0)	597 (100.0)	11.15 (100.0)	2.73 (100.0)	
先天性代謝異常による腎不全	1 (%) (0.7)	9 (6.7) (13.3)	18 (13.3) (14.8)	20 (14.8) (20.0)	27 (20.0) (21.5)	29 (21.5) (14.8)	20 (14.8) (8.1)	11 (8.1) (100.0)	135 (100.0)	2 (100.0)	137 (100.0)	11.21 (100.0)	3.57 (100.0)	
腎・尿路結核		2 (%) (2.2)	4 (4.5) (19.1)	17 (19.1) (33.7)	30 (33.7) (24.7)	22 (24.7) (11.2)	10 (11.2) (4.5)	4 (4.5) (100.0)	89 (100.0)	5 (100.0)	94 (100.0)	9.35 (100.0)	2.55 (100.0)	
腎・尿路結石		4 (%) (1.4)	10 (3.4) (14.0)	41 (14.0) (28.3)	83 (28.3) (26.3)	77 (26.3) (15.7)	46 (15.7) (6.5)	19 (6.5) (4.4)	13 (4.4) (100.0)	293 (100.0)	11 (100.0)	304 (100.0)	10.45 (100.0)	3.01 (100.0)
腎・尿路腫瘍		1 (%) (0.2)	22 (5.1) (9.9)	43 (9.9) (24.5)	106 (24.5) (32.3)	140 (32.3) (19.9)	86 (19.9) (6.2)	27 (6.2) (1.8)	8 (1.8) (100.0)	433 (100.0)	9 (100.0)	442 (100.0)	10.49 (100.0)	2.57 (100.0)
閉塞性尿路障害	1 (%) (0.3)	9 (2.6) (7.6)	26 (7.6) (17.2)	59 (17.2) (22.4)	77 (22.4) (22.7)	78 (22.7) (16.6)	57 (16.6) (7.0)	24 (7.0) (3.8)	13 (3.8) (100.0)	344 (100.0)	11 (100.0)	355 (100.0)	10.02 (100.0)	3.25 (100.0)
骨髄腫		2 (%) (2.2)	7 (7.9) (23.6)	21 (23.6) (28.1)	25 (28.1) (25.8)	23 (25.8) (9.0)	8 (9.0) (3.4)	3 (3.4) (100.0)	89 (100.0)	3 (100.0)	92 (100.0)	9.08 (100.0)	2.52 (100.0)	
腎形成不全		5 (%) (1.6)	21 (6.5) (13.0)	42 (13.0) (22.7)	73 (22.7) (29.5)	95 (29.5) (18.6)	60 (18.6) (8.1)	26 (8.1) (100.0)	322 (100.0)	4 (100.0)	326 (100.0)	12.27 (100.0)	2.94 (100.0)	
不明	13 (%) (0.1)	204 (1.4) (6.3)	887 (6.3) (16.8)	2,371 (16.8) (27.2)	3,827 (27.2) (24.9)	3,506 (24.9) (14.7)	2,066 (14.7) (6.1)	863 (6.1) (2.4)	337 (2.4) (100.0)	14,074 (100.0)	602 (100.0)	14,676 (100.0)	9.93 (100.0)	2.90 (100.0)
再導入		5 (%) (0.5)	25 (2.7) (6.8)	64 (6.8) (18.0)	169 (18.0) (28.8)	271 (28.8) (26.6)	250 (26.6) (12.3)	116 (12.3) (4.4)	41 (4.4) (100.0)	941 (100.0)	26 (100.0)	967 (100.0)	11.41 (100.0)	2.75 (100.0)
その他	8 (%) (0.2)	69 (1.9) (6.5)	243 (6.5) (15.3)	567 (15.3) (25.4)	943 (25.4) (23.9)	890 (23.9) (15.9)	593 (15.9) (8.2)	304 (8.2) (2.7)	101 (2.7) (100.0)	3,718 (100.0)	84 (100.0)	3,802 (100.0)	10.10 (100.0)	3.06 (100.0)
合計	70 (%) (0.0)	1,630 (1.0) (5.0)	7,842 (5.0) (15.0)	23,488 (15.0) (27.2)	42,600 (27.2) (26.9)	42,182 (26.9) (16.3)	25,484 (16.3) (6.4)	9,996 (6.4) (2.1)	3,239 (2.1) (100.0)	156,531 (100.0)	4,602 (100.0)	161,133 (100.0)	10.14 (100.0)	2.78 (100.0)
記載なし														
総計	70 (%) (0.0)	1,630 (1.0) (5.0)	7,842 (5.0) (15.0)	23,488 (15.0) (27.2)	42,600 (27.2) (26.9)	42,182 (26.9) (16.3)	25,484 (16.3) (6.4)	9,996 (6.4) (2.1)	3,239 (2.1) (100.0)	156,531 (100.0)	4,602 (100.0)	161,133 (100.0)	10.14 (100.0)	2.78 (100.0)

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D2713##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査