

表 989 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

性別	2未満	2~	4~	6~	8~	10~	12~	14~	16~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	8 (0.0)	124 (0.3)	686 (1.9)	3,050 (8.4)	7,459 (20.5)	10,416 (28.7)	8,780 (24.2)	4,219 (11.6)	1,586 (4.4)	36,328 (100.0)	839	37,167	11.29	2.73
女性 (%)	6 (0.0)	167 (0.8)	983 (4.8)	3,762 (18.2)	7,271 (35.2)	6,047 (29.3)	2,061 (10.0)	320 (1.5)	34 (0.2)	20,651 (100.0)	512	21,163	9.43	2.17
合計 (%)	14 (0.0)	291 (0.5)	1,669 (2.9)	6,812 (12.0)	14,730 (25.9)	16,463 (28.9)	10,841 (19.0)	4,539 (8.0)	1,620 (2.8)	56,979 (100.0)	1,351	58,330	10.62	2.69
記載なし (%)														
総計 (%)	14 (0.0)	291 (0.5)	1,669 (2.9)	6,812 (12.0)	14,730 (25.9)	16,463 (28.9)	10,841 (19.0)	4,539 (8.0)	1,620 (2.8)	56,979 (100.0)	1,351	58,330	10.62	2.69

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2720##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査