

表 991 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)														
2年～ (%)	8 (0.1)	161 (1.0)	721 (4.6)	2,490 (16.0)	4,321 (27.7)	4,012 (25.7)	2,469 (15.8)	996 (6.4)	407 (2.6)	15,585 (100.0)	353	15,938	10.13	2.81
5年～ (%)	4 (0.0)	62 (0.4)	520 (3.0)	1,876 (10.9)	4,233 (24.7)	4,983 (29.0)	3,373 (19.6)	1,546 (9.0)	569 (3.3)	17,166 (100.0)	416	17,582	10.77	2.73
10年～ (%)	2 (0.0)	37 (0.4)	193 (2.0)	969 (9.8)	2,297 (23.3)	2,973 (30.2)	2,126 (21.6)	921 (9.3)	340 (3.4)	9,858 (100.0)	258	10,116	10.98	2.67
15年～ (%)		12 (0.2)	75 (1.3)	498 (8.4)	1,424 (24.0)	1,841 (31.0)	1,349 (22.7)	560 (9.4)	172 (2.9)	5,931 (100.0)	127	6,058	11.05	2.48
20年～ (%)		10 (0.3)	60 (1.6)	336 (8.9)	947 (25.0)	1,236 (32.7)	777 (20.6)	319 (8.4)	96 (2.5)	3,781 (100.0)	76	3,857	10.89	2.52
25年～ (%)		1 (0.0)	30 (1.3)	225 (9.8)	650 (28.4)	735 (32.1)	477 (20.8)	142 (6.2)	28 (1.2)	2,288 (100.0)	57	2,345	10.64	2.25
30年～ (%)		3 (0.2)	16 (1.2)	168 (12.7)	467 (35.2)	429 (32.3)	198 (14.9)	39 (2.9)	7 (0.5)	1,327 (100.0)	40	1,367	10.09	2.08
35年～ (%)		2 (0.3)	31 (4.1)	157 (20.5)	292 (38.2)	207 (27.1)	60 (7.8)	15 (2.0)	1 (0.1)	765 (100.0)	15	780	9.33	2.06
40年～ (%)		3 (1.1)	23 (8.3)	93 (33.5)	99 (35.6)	47 (16.9)	12 (4.3)	1 (0.4)		278 (100.0)	9	287	8.43	1.94
合計 (%)	14 (0.0)	291 (0.5)	1,669 (2.9)	6,812 (12.0)	14,730 (25.9)	16,463 (28.9)	10,841 (19.0)	4,539 (8.0)	1,620 (2.8)	56,979 (100.0)	1,351	58,330	10.62	2.69
不明 (%)														
記載なし (%)														
総計 (%)	14 (0.0)	291 (0.5)	1,669 (2.9)	6,812 (12.0)	14,730 (25.9)	16,463 (28.9)	10,841 (19.0)	4,539 (8.0)	1,620 (2.8)	56,979 (100.0)	1,351	58,330	10.62	2.69
平均	5.07	7.03	8.23	9.97	10.88	11.04	10.79	10.22	9.28	10.60	10.67	10.60		
標準偏差	3.81	7.29	8.31	9.24	9.00	8.29	7.57	6.83	6.10	8.33	8.42	8.33		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2722##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査