

表 992 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

原疾患	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)		54 (0.3)	332 (1.6)	1,805 (8.9)	4,687 (23.2)	6,171 (30.5)	4,406 (21.8)	2,030 (10.0)	748 (3.7)	20,233 (100.0)	467	20,700	11.09	2.62
慢性腎盂腎炎 (%)		1 (0.2)	18 (3.2)	77 (13.8)	135 (24.3)	166 (29.9)	105 (18.9)	43 (7.7)	11 (2.0)	556 (100.0)	15	571	10.54	2.55
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1 (0.3)	7 (1.8)	18 (4.6)	48 (12.2)	96 (24.3)	106 (26.8)	71 (18.0)	34 (8.6)	14 (3.5)	395 (100.0)	2	397	10.48	3.32
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)			10 (2.3)	65 (14.7)	164 (37.2)	150 (34.0)	42 (9.5)	10 (2.3)		441 (100.0)	6	447	9.75	1.92
その他の分類不能の腎炎 (%)		1 (0.3)	7 (2.3)	25 (8.1)	57 (18.6)	84 (27.4)	73 (23.8)	45 (14.7)	15 (4.9)	307 (100.0)	10	317	11.42	2.87
多発性嚢胞腎 (%)		3 (0.1)	32 (1.4)	230 (10.1)	570 (25.1)	719 (31.7)	463 (20.4)	183 (8.1)	71 (3.1)	2,271 (100.0)	42	2,313	10.89	2.55
腎硬化症 (%)	1 (0.0)	28 (0.6)	172 (3.9)	653 (14.7)	1,230 (27.4)	1,217 (27.4)	744 (16.7)	291 (6.5)	110 (2.5)	4,446 (100.0)	98	4,544	10.29	2.70
悪性高血圧 (%)		3 (0.6)	11 (2.4)	35 (7.5)	81 (17.5)	125 (26.9)	114 (24.6)	59 (12.7)	36 (7.8)	464 (100.0)	10	474	11.66	3.36
糖尿病性腎症 (%)	5 (0.0)	125 (0.6)	748 (3.9)	2,867 (14.8)	5,644 (29.2)	5,441 (28.2)	3,165 (16.4)	1,044 (5.4)	285 (1.5)	19,324 (100.0)	458	19,782	10.12	2.57
SLE腎炎 (%)		3 (0.6)	21 (4.5)	72 (15.5)	127 (27.3)	139 (29.8)	71 (15.2)	23 (4.9)	10 (2.1)	466 (100.0)	14	480	10.11	2.68
アミロイド腎 (%)		1 (1.5)	7 (10.4)	12 (17.9)	23 (34.3)	10 (14.9)	12 (17.9)	2 (3.0)		67 (100.0)	3	70	9.29	2.81
痛風腎 (%)			8 (3.9)	14 (6.8)	38 (18.5)	57 (27.8)	43 (21.0)	29 (14.1)	16 (7.8)	205 (100.0)	2	207	11.51	2.97
先天性代謝異常による腎不全 (%)			2 (3.1)	4 (6.3)	10 (15.6)	14 (21.9)	17 (26.6)	12 (18.8)	5 (7.8)	64 (100.0)	2	66	11.77	2.85
腎・尿路結核 (%)			1 (2.6)	5 (12.8)	18 (46.2)	10 (25.6)	5 (12.8)			39 (100.0)	1	40	9.56	1.93
腎・尿路結石 (%)		1 (1.1)	2 (2.1)	9 (9.5)	23 (24.2)	30 (31.6)	22 (23.2)	6 (6.3)	2 (2.1)	95 (100.0)	5	100	10.92	2.73
腎・尿路腫瘍 (%)			3 (2.2)	13 (9.6)	28 (20.7)	41 (30.4)	35 (25.9)	13 (9.6)	2 (1.5)	135 (100.0)	4	139	11.06	2.55
閉塞性尿路障害 (%)		3 (2.3)	8 (6.1)	16 (12.2)	30 (22.9)	31 (23.7)	26 (19.8)	11 (8.4)	6 (4.6)	131 (100.0)	1	132	10.56	3.25
骨髄腫 (%)		1 (4.8)	2 (9.5)	5 (23.8)	6 (28.6)	2 (9.5)	1 (4.8)	3 (14.3)	1 (4.8)	21 (100.0)	1	22	9.69	3.60
腎形成不全 (%)				4 (2.7)	13 (8.7)	34 (22.7)	43 (28.7)	42 (28.0)	14 (9.3)	150 (100.0)	3	153	12.92	2.50
不明 (%)	7 (0.1)	38 (0.7)	207 (3.9)	650 (12.4)	1,343 (25.6)	1,396 (26.6)	977 (18.6)	434 (8.3)	191 (3.6)	5,243 (100.0)	161	5,404	10.57	2.86
再導入 (%)		2 (0.4)	7 (1.3)	31 (5.6)	95 (17.2)	165 (29.9)	144 (26.1)	79 (14.3)	28 (5.1)	551 (100.0)	13	564	11.68	2.63
その他 (%)		20 (1.5)	53 (3.9)	172 (12.5)	312 (22.7)	355 (25.8)	262 (19.1)	146 (10.6)	55 (4.0)	1,375 (100.0)	33	1,408	10.72	3.06
合計 (%)	14 (0.0)	291 (0.5)	1,669 (2.9)	6,812 (12.0)	14,730 (25.9)	16,463 (28.9)	10,841 (19.0)	4,539 (8.0)	1,620 (2.8)	56,979 (100.0)	1,351	58,330	10.62	2.69
記載なし (%)														
総計 (%)	14 (0.0)	291 (0.5)	1,669 (2.9)	6,812 (12.0)	14,730 (25.9)	16,463 (28.9)	10,841 (19.0)	4,539 (8.0)	1,620 (2.8)	56,979 (100.0)	1,351	58,330	10.62	2.69

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2723##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査