

表 994 クレアチニン濃度(mg/dL) 性別 (腹膜透析患者)

性別	2未満	2~	4~	6~	8~	10~	12~	14~	16~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	6 (0.2)	82 (2.2)	285 (7.6)	639 (17.0)	752 (20.0)	755 (20.0)	616 (16.4)	369 (9.8)	263 (7.0)	3,767 (100.0)	1,835	5,602	10.43	3.59
女性 (%)	8 (0.4)	76 (3.8)	295 (14.6)	497 (24.6)	512 (25.4)	355 (17.6)	191 (9.5)	72 (3.6)	12 (0.6)	2,018 (100.0)	995	3,013	8.63	2.95
合計 (%)	14 (0.2)	158 (2.7)	580 (10.0)	1,136 (19.6)	1,264 (21.8)	1,110 (19.2)	807 (13.9)	441 (7.6)	275 (4.8)	5,785 (100.0)	2,830	8,615	9.80	3.49
記載なし (%)														
総計 (%)	14 (0.2)	158 (2.7)	580 (10.0)	1,136 (19.6)	1,264 (21.8)	1,110 (19.2)	807 (13.9)	441 (7.6)	275 (4.8)	5,785 (100.0)	2,830	8,615	9.80	3.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2730##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査