

表 995 クレアチニン濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	2未満	2~	4~	6~	8~	10~	12~	14~	16~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)		10 (16.4)	16 (26.2)	14 (23.0)	12 (19.7)	5 (8.2)	1 (1.6)	3 (4.9)		61 (100.0)	24	85	7.11	3.15
15歳~ (%)		1 (1.6)	3 (4.8)	12 (19.4)	12 (19.4)	9 (14.5)	12 (19.4)	4 (6.5)	9 (14.5)	62 (100.0)	32	94	10.94	3.89
30歳~ (%)	1 (0.2)	7 (1.7)	19 (4.7)	48 (12.0)	60 (15.0)	62 (15.5)	72 (18.0)	68 (17.0)	64 (16.0)	401 (100.0)	207	608	11.89	4.02
45歳~ (%)	2 (0.1)	20 (1.3)	74 (4.8)	183 (12.0)	302 (19.7)	316 (20.6)	299 (19.5)	200 (13.1)	135 (8.8)	1,531 (100.0)	752	2,283	11.17	3.49
60歳~ (%)	3 (0.1)	53 (2.1)	221 (8.7)	500 (19.7)	610 (24.0)	567 (22.3)	370 (14.6)	152 (6.0)	64 (2.5)	2,540 (100.0)	1,178	3,718	9.69	3.14
75歳~ (%)	7 (0.6)	58 (5.2)	224 (20.1)	347 (31.1)	263 (23.6)	148 (13.3)	52 (4.7)	14 (1.3)	3 (0.3)	1,116 (100.0)	585	1,701	7.75	2.61
90歳~ (%)	1 (1.4)	9 (12.2)	23 (31.1)	32 (43.2)	5 (6.8)	3 (4.1)	1 (1.4)			74 (100.0)	52	126	6.14	2.08
合計 (%)	14 (0.2)	158 (2.7)	580 (10.0)	1,136 (19.6)	1,264 (21.8)	1,110 (19.2)	807 (13.9)	441 (7.6)	275 (4.8)	5,785 (100.0)	2,830	8,615	9.80	3.49
不明 (%)														
記載なし (%)														
総計 (%)	14 (0.2)	158 (2.7)	580 (10.0)	1,136 (19.6)	1,264 (21.8)	1,110 (19.2)	807 (13.9)	441 (7.6)	275 (4.8)	5,785 (100.0)	2,830	8,615	9.80	3.49
平均	73.21	66.93	69.38	67.42	64.15	62.41	58.95	55.14	50.91	63.04	63.40	63.16		
標準偏差	14.54	21.31	16.59	14.80	13.33	11.95	11.70	11.30	11.85	14.42	14.62	14.48		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

#D2731##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査