

表996 クレアチニン濃度(mg/dL) 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	2未満	2~	4~	6~	8~	10~	12~	14~	16~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満	9 (%)	109 (0.4)	403 (4.5)	685 (16.6)	524 (28.1)	322 (21.5)	212 (13.2)	103 (8.7)	67 (4.2)	2,434 (2.8)	1,184 (100.0)	3,618	8.56	3.33
2年~	3 (%)	36 (0.2)	125 (1.8)	324 (6.3)	453 (16.3)	437 (22.8)	314 (22.0)	176 (15.8)	115 (8.9)	1,983 (5.8)	1,001 (100.0)	2,984	10.37	3.37
5年~	1 (%)	13 (0.1)	41 (1.2)	98 (3.9)	215 (9.3)	263 (20.4)	216 (24.9)	130 (20.5)	79 (12.3)	1,056 (7.5)	519 (100.0)	1,575	11.24	3.28
10年~	1 (%)	10 (0.5)	15 (4.7)	44 (7.0)	59 (20.6)	46 (27.6)	27 (21.5)	27 (12.6)	12 (5.6)	214 (100.0)	75	289	11.29	3.03
15年~		1 (%)	8 (1.6)	18 (12.7)	18 (28.6)	14 (28.6)	2 (22.2)	2 (3.2)	2 (3.2)	63 (100.0)	22	85	10.65	2.51
20年~		5 (%)	5 (25.0)	6 (25.0)	3 (30.0)	3 (15.0)	1 (5.0)			20 (100.0)	8	28	9.95	2.34
25年~		1 (%)	1 (20.0)	3 (20.0)	3 (20.0)					5 (100.0)	4	9	9.50	1.56
30年~		1 (%)	2 (25.0)	2 (50.0)			1 (25.0)	1 (25.0)		4 (100.0)	2	6	11.05	2.42
35年~		1 (%)	1 (100.0)							1 (100.0)	1	1	8.50	
40年~		2 (%)	2 (100.0)							2 (100.0)	2	2	8.20	0.28
合計	14 (%)	158 (2.7)	580 (10.0)	1,136 (19.6)	1,264 (21.9)	1,110 (19.2)	805 (13.9)	440 (7.6)	275 (4.8)	5,782 (100.0)	2,815	8,597	9.80	3.49
不明							2 (66.7)	1 (33.3)		3 (100.0)	15	18	13.30	0.87
記載なし														
総計	14 (%)	158 (2.7)	580 (10.0)	1,136 (19.6)	1,264 (21.8)	1,110 (19.2)	807 (13.9)	441 (7.6)	275 (4.8)	5,785 (100.0)	2,830	8,615	9.80	3.49
平均	2.00	1.41	1.50	1.92	3.17	3.93	4.06	4.17	3.85	3.08	2.91	3.03		
標準偏差	2.96	1.92	2.38	2.90	3.98	4.00	3.63	3.57	3.04	3.62	3.30	3.52		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2732##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査