

表 997 クレアチニン濃度(mg/dL) 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	3 (0.2)	19 (1.0)	123 (6.7)	281 (15.4)	389 (21.3)	404 (22.1)	299 (16.4)	192 (10.5)	114 (6.3)	1,824 (100.0)	842	2,666	10.58	3.40
慢性腎盂腎炎 (%)		1 (1.4)	5 (6.8)	18 (24.3)	21 (28.4)	11 (14.9)	14 (18.9)	2 (2.7)	2 (2.7)	74 (100.0)	23	97	9.66	3.03
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1 (2.2)	6 (13.3)	3 (6.7)	7 (15.6)	12 (26.7)	5 (11.1)	6 (13.3)	3 (6.7)	2 (4.4)	45 (100.0)	16	61	9.12	4.13
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)			2 (10.0)	3 (15.0)	4 (20.0)	5 (25.0)	4 (20.0)	1 (5.0)	1 (5.0)	20 (100.0)	4	24	10.38	3.00
その他の分類不能の腎炎 (%)		3 (5.7)	3 (5.7)	10 (18.9)	7 (13.2)	12 (22.6)	9 (17.0)	3 (5.7)	6 (11.3)	53 (100.0)	22	75	10.51	4.09
多発性嚢胞腎 (%)		3 (1.7)	10 (5.5)	34 (18.8)	44 (24.3)	38 (21.0)	30 (16.6)	13 (7.2)	9 (5.0)	181 (100.0)	91	272	10.25	3.28
腎硬化症 (%)	1 (0.1)	33 (4.4)	109 (14.5)	173 (23.0)	163 (21.7)	128 (17.0)	93 (12.4)	34 (4.5)	18 (2.4)	752 (100.0)	354	1,106	8.98	3.28
悪性高血圧 (%)		1 (1.4)	12 (17.4)	12 (17.4)	10 (14.5)	10 (14.5)	5 (7.2)	9 (13.0)	10 (14.5)	69 (100.0)	37	106	10.47	4.51
糖尿病性腎症 (%)	2 (0.1)	50 (2.7)	223 (12.2)	404 (22.1)	413 (22.6)	332 (18.2)	220 (12.0)	123 (6.7)	61 (3.3)	1,828 (100.0)	918	2,746	9.38	3.36
SLE腎炎 (%)	1 (3.1)	3 (9.4)	1 (3.1)	7 (21.9)	7 (21.9)	5 (15.6)	5 (15.6)	2 (6.3)	1 (3.1)	32 (100.0)	23	55	9.12	3.82
アミロイド腎 (%)				6 (50.0)	2 (16.7)	3 (25.0)		1 (8.3)		12 (100.0)	4	16	9.08	2.39
痛風腎 (%)		1 (6.3)	2 (12.5)	1 (6.3)	2 (12.5)	3 (18.8)	2 (12.5)	3 (18.8)	2 (12.5)	16 (100.0)	7	23	10.78	4.21
先天性代謝異常による腎不全 (%)			3 (23.1)	2 (15.4)	3 (23.1)	1 (7.7)	2 (15.4)		2 (15.4)	13 (100.0)	4	17	9.66	3.94
腎・尿路結核 (%)											1	1		
腎・尿路結石 (%)			1 (6.3)	3 (18.8)	3 (18.8)	7 (43.8)	1 (6.3)	1 (6.3)		16 (100.0)	5	21	9.88	2.47
腎・尿路腫瘍 (%)				2 (25.0)	1 (12.5)	3 (37.5)			2 (25.0)	8 (100.0)	4	12	12.90	7.97
閉塞性尿路障害 (%)			1 (8.3)	1 (8.3)	6 (50.0)	1 (8.3)		2 (16.7)	1 (8.3)	12 (100.0)	8	20	10.27	3.69
骨髄腫 (%)		1 (20.0)		1 (20.0)	3 (60.0)					5 (100.0)	2	7	7.26	2.34
腎形成不全 (%)		2 (4.7)	10 (23.3)	5 (11.6)	7 (16.3)	5 (11.6)	6 (14.0)	6 (14.0)	2 (4.7)	43 (100.0)	22	65	9.68	4.43
不明 (%)	3 (0.5)	22 (3.9)	45 (7.9)	131 (23.1)	124 (21.8)	101 (17.8)	84 (14.8)	31 (5.5)	27 (4.8)	568 (100.0)	321	889	9.58	3.43
再導入 (%)		2 (4.1)	6 (12.2)	4 (8.2)	10 (20.4)	9 (18.4)	7 (14.3)	3 (6.1)	8 (16.3)	49 (100.0)	16	65	10.76	4.28
その他 (%)	3 (1.8)	11 (6.7)	21 (12.7)	31 (18.8)	33 (20.0)	27 (16.4)	20 (12.1)	12 (7.3)	7 (4.2)	165 (100.0)	106	271	9.26	3.83
合計 (%)	14 (0.2)	158 (2.7)	580 (10.0)	1,136 (19.6)	1,264 (21.8)	1,110 (19.2)	807 (13.9)	441 (7.6)	275 (4.8)	5,785 (100.0)	2,830	8,615	9.80	3.49
記載なし (%)														
総計 (%)	14 (0.2)	158 (2.7)	580 (10.0)	1,136 (19.6)	1,264 (21.8)	1,110 (19.2)	807 (13.9)	441 (7.6)	275 (4.8)	5,785 (100.0)	2,830	8,615	9.80	3.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
##D2733##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査