

表 998 クレアチニン濃度(mg/dL) 医療機関別 (腹膜透析患者)

医療機関	2未満	2~	4~	6~	8~	10~	12~	14~	16~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学		10	26	72	76	51	37	25	16	313	243	556	9.80	3.61
(%)		(3.2)	(8.3)	(23.0)	(24.3)	(16.3)	(11.8)	(8.0)	(5.1)	(100.0)				
私立大学		17	73	134	149	139	114	54	34	714	435	1,149	9.87	3.41
(%)		(2.4)	(10.2)	(18.8)	(20.9)	(19.5)	(16.0)	(7.6)	(4.8)	(100.0)				
国立病院・機構等		8	28	42	45	28	13	13	8	185	42	227	9.00	3.43
(%)		(4.3)	(15.1)	(22.7)	(24.3)	(15.1)	(7.0)	(7.0)	(4.3)	(100.0)				
県市町村立・国保	4	30	120	250	254	188	166	86	35	1,133	467	1,600	9.56	3.48
(%)	(0.4)	(2.6)	(10.6)	(22.1)	(22.4)	(16.6)	(14.7)	(7.6)	(3.1)	(100.0)				
JCHO(旧社会保険)等	1	1	19	22	42	25	24	7	8	149	347	496	9.85	3.35
(%)	(0.7)	(0.7)	(12.8)	(14.8)	(28.2)	(16.8)	(16.1)	(4.7)	(5.4)	(100.0)				
厚生連等		6	22	62	99	90	53	26	14	372	179	551	10.10	3.08
(%)		(1.6)	(5.9)	(16.7)	(26.6)	(24.2)	(14.2)	(7.0)	(3.8)	(100.0)				
その他公的	2	35	104	207	205	177	93	68	33	924	403	1,327	9.35	3.44
(%)	(0.2)	(3.8)	(11.3)	(22.4)	(22.2)	(19.2)	(10.1)	(7.4)	(3.6)	(100.0)				
私立総合	2	10	27	61	73	77	54	28	25	357	36	393	10.23	3.60
(%)	(0.6)	(2.8)	(7.6)	(17.1)	(20.4)	(21.6)	(15.1)	(7.8)	(7.0)	(100.0)				
私立	2	32	115	215	210	221	150	78	51	1,074	552	1,626	9.78	3.49
(%)	(0.2)	(3.0)	(10.7)	(20.0)	(19.6)	(20.6)	(14.0)	(7.3)	(4.7)	(100.0)				
私立診療所	3	9	46	71	111	114	103	56	51	564	126	690	10.75	3.65
(%)	(0.5)	(1.6)	(8.2)	(12.6)	(19.7)	(20.2)	(18.3)	(9.9)	(9.0)	(100.0)				
総計	14	158	580	1,136	1,264	1,110	807	441	275	5,785	2,830	8,615	9.80	3.49
(%)	(0.2)	(2.7)	(10.0)	(19.6)	(21.8)	(19.2)	(13.9)	(7.6)	(4.8)	(100.0)				

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#D2734##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査