

表 1002 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 原疾患別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

原疾患	0.4未満	0.4~	0.6~	0.8~	1.0~	1.2~	1.4~	1.6~	1.8~	2.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎	33 (%)	30 (0.1)	123 (0.1)	657 (0.3)	3,139 (1.5)	8,969 (7.1)	12,439 (20.4)	9,703 (28.3)	5,230 (22.1)	3,653 (11.9)	43,976 (8.3)	5,257 (100.0)	49,233 (100.0)	1.56	0.31
慢性腎盂腎炎			5 (0.4)	23 (1.7)	96 (6.9)	263 (19.0)	350 (25.2)	327 (23.6)	190 (13.7)	133 (9.6)	1,387 (100.0)	166 (100.0)	1,553 (100.0)	1.59	0.32
急速進行性糸球体腎炎		1 (0.1)	3 (0.3)	18 (1.6)	65 (5.9)	225 (20.5)	277 (25.3)	242 (22.1)	160 (14.6)	104 (9.5)	1,095 (100.0)	116 (100.0)	1,211 (100.0)	1.59	0.31
妊娠腎/妊娠中毒症		1 (0.1)	1 (0.1)	5 (0.7)	19 (2.5)	61 (8.2)	173 (23.1)	236 (31.6)	149 (19.9)	103 (13.8)	748 (100.0)	62 (100.0)	810 (100.0)	1.70	0.29
その他の分類不能の腎炎		2 (0.3)	5 (0.8)	12 (1.9)	33 (5.2)	129 (20.4)	156 (24.6)	143 (22.6)	95 (15.0)	58 (9.2)	633 (100.0)	76 (100.0)	709 (100.0)	1.58	0.31
多発性囊胞腎	3 (%)	4 (0.1)	15 (0.1)	107 (0.3)	535 (1.9)	1,422 (9.5)	1,630 (25.2)	1,122 (28.9)	507 (19.9)	287 (9.0)	5,632 (5.1)	605 (100.0)	6,237 (100.0)	1.50	0.29
腎硬化症	10 (%)	13 (0.1)	65 (0.1)	303 (0.5)	1,321 (2.3)	3,294 (10.0)	3,720 (25.0)	2,513 (28.3)	1,184 (19.1)	732 (9.0)	13,155 (5.6)	1,536 (100.0)	14,691 (100.0)	1.50	0.30
悪性高血圧	2 (%)	3 (0.2)	6 (0.2)	43 (0.5)	127 (3.5)	306 (10.3)	323 (24.8)	245 (26.2)	119 (19.9)	58 (9.7)	1,232 (4.7)	137 (100.0)	1,369 (100.0)	1.49	0.30
糖尿病性腎症	38 (%)	72 (0.1)	320 (0.1)	1,890 (0.6)	7,381 (3.5)	15,712 (13.5)	15,500 (28.8)	8,586 (28.4)	3,364 (15.7)	1,776 (6.2)	54,639 (3.3)	7,598 (100.0)	62,237 (100.0)	1.43	0.28
SLE腎炎			2 (0.2)	17 (1.8)	52 (5.4)	130 (13.4)	228 (23.5)	243 (25.0)	159 (16.4)	140 (14.4)	971 (100.0)	124 (100.0)	1,095 (100.0)	1.65	0.33
アミロイド腎	1 (%)	1 (0.6)		3 (0.6)	17 (10.2)	36 (21.6)	36 (21.6)	32 (19.2)	23 (13.8)	18 (10.8)	167 (100.0)	29 (100.0)	196 (100.0)	1.56	0.37
痛風腎			1 (0.2)	6 (1.1)	50 (9.4)	147 (27.7)	159 (30.0)	102 (19.2)	44 (8.3)	21 (4.0)	530 (100.0)	67 (100.0)	597 (100.0)	1.49	0.28
先天性代謝異常による腎不全				8 (6.6)	28 (23.0)	32 (26.2)	24 (19.7)	17 (13.9)	13 (10.7)	122 (100.0)	15 (100.0)	137 (100.0)	1.60	0.32	
腎・尿路結核	1 (%)			1 (1.2)	8 (1.2)	12 (9.5)	23 (14.3)	20 (27.4)	14 (23.8)	5 (16.7)	84 (6.0)	10 (100.0)	94 (100.0)	1.56	0.32
腎・尿路結石				10 (3.6)	23 (8.3)	49 (17.6)	100 (36.0)	53 (19.1)	22 (7.9)	21 (7.6)	278 (100.0)	26 (100.0)	304 (100.0)	1.53	0.30
腎・尿路腫瘍		2 (0.5)		13 (3.2)	40 (9.9)	104 (25.7)	121 (29.9)	78 (19.3)	25 (6.2)	22 (5.4)	405 (100.0)	37 (100.0)	442 (100.0)	1.48	0.30
閉塞性尿路障害			6 (1.9)	44 (13.6)	77 (23.8)	75 (23.2)	59 (18.3)	35 (10.8)	27 (8.4)	323 (100.0)	32 (100.0)	355 (100.0)	355 (100.0)	1.53	0.33
骨髄腫			2 (2.4)	3 (3.6)	3 (3.6)	29 (34.9)	21 (25.3)	12 (14.5)	9 (10.8)	4 (4.8)	83 (100.0)	9 (100.0)	92 (100.0)	1.48	0.31
腎形成不全			3 (1.0)	6 (2.0)	13 (4.4)	43 (14.7)	82 (28.0)	65 (22.2)	48 (16.4)	33 (11.3)	293 (100.0)	33 (100.0)	326 (100.0)	1.62	0.33
不明	11 (%)	8 (0.1)	61 (0.5)	300 (2.4)	1,184 (9.4)	2,937 (23.4)	3,561 (28.3)	2,445 (19.5)	1,271 (10.1)	788 (6.3)	12,566 (100.0)	2,110 (100.0)	14,676 (100.0)	1.51	0.30
再導入		1 (0.1)	2 (0.2)	11 (1.3)	63 (7.2)	173 (19.7)	235 (26.8)	196 (22.3)	113 (12.9)	84 (9.6)	878 (100.0)	89 (100.0)	967 (100.0)	1.59	0.33
その他	2 (%)	5 (0.2)	18 (0.5)	68 (2.1)	295 (9.0)	713 (21.7)	898 (27.3)	703 (21.4)	335 (10.2)	251 (7.6)	3,288 (100.0)	514 (100.0)	3,802 (100.0)	1.54	0.32
合計	101 (%)	141 (0.1)	634 (0.4)	3,502 (2.5)	14,516 (10.2)	34,859 (24.5)	40,139 (28.2)	27,149 (19.1)	13,113 (9.2)	8,331 (5.8)	142,485 (100.0)	18,648 (100.0)	161,133 (100.0)	1.50	0.30
記載なし															
総計	101 (%)	141 (0.1)	634 (0.4)	3,502 (2.5)	14,516 (10.2)	34,859 (24.5)	40,139 (28.2)	27,149 (19.1)	13,113 (9.2)	8,331 (5.8)	142,485 (100.0)	18,648 (100.0)	161,133 (100.0)	1.50	0.30

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2813#

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査