

表 1014 equilibrated Kt/V(eKt/V) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

性別	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	27	49	452	2,961	10,286	11,749	5,318	1,870	577	299	33,588	3,579	37,167	1.26	0.24
(%)	(0.1)	(0.1)	(1.3)	(8.8)	(30.6)	(35.0)	(15.8)	(5.6)	(1.7)	(0.9)	(100.0)				
女性	14	23	99	590	2,244	4,978	5,602	3,417	1,340	865	19,172	1,991	21,163	1.47	0.29
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.5)	(3.1)	(11.7)	(26.0)	(29.2)	(17.8)	(7.0)	(4.5)	(100.0)				
合計	41	72	551	3,551	12,530	16,727	10,920	5,287	1,917	1,164	52,760	5,570	58,330	1.34	0.28
(%)	(0.1)	(0.1)	(1.0)	(6.7)	(23.7)	(31.7)	(20.7)	(10.0)	(3.6)	(2.2)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	41	72	551	3,551	12,530	16,727	10,920	5,287	1,917	1,164	52,760	5,570	58,330	1.34	0.28
(%)	(0.1)	(0.1)	(1.0)	(6.7)	(23.7)	(31.7)	(20.7)	(10.0)	(3.6)	(2.2)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
##D2920##  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2016年調査