

表 1017 equilibrated Kt/V(eKt/V) 原疾患別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

原疾患	0.4未満	0.4~	0.6~	0.8~	1.0~	1.2~	1.4~	1.6~	1.8~	2.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差	
慢性糸球体腎炎	11 (%)	13 (0.1)	123 (0.1)	784 (0.7)	3,538 (4.2)	5,902 (18.8)	4,545 (31.3)	2,396 (24.1)	916 (12.7)	615 (4.9)	18,843 (3.3)	1,857 (100.0)	20,700	1.39	0.28	
慢性腎盂腎炎		3 (%)	15 (0.6)	82 (2.9)	151 (15.8)	137 (29.0)	86 (26.3)	34 (16.5)	12 (6.5)	520 (2.3)	51 (100.0)	571	1.43	0.27		
急速進行性糸球体腎炎		1 (%)	3 (0.3)	18 (0.8)	53 (5.0)	104 (14.7)	96 (28.9)	56 (26.7)	17 (15.6)	12 (4.7)	360 (3.3)	37 (100.0)	397	1.40	0.28	
妊娠腎/妊娠中毒症				8 (%)	30 (1.9)	91 (7.2)	120 (21.9)	105 (28.8)	34 (25.2)	28 (8.2)	416 (6.7)	31 (100.0)	447	1.54	0.28	
その他の分類不能の腎炎				4 (%)	13 (1.4)	48 (4.5)	90 (16.8)	71 (31.5)	43 (24.8)	12 (15.0)	286 (4.2)	31 (100.0)	317	1.39	0.28	
多発性囊胞腎	2 (%)	3 (0.1)	29 (0.1)	139 (1.4)	510 (6.6)	729 (24.2)	412 (34.6)	179 (19.6)	69 (8.5)	33 (3.3)	2,105 (1.6)	208 (100.0)	2,313	1.32	0.26	
腎硬化症	5 (%)	5 (0.1)	37 (0.1)	301 (0.9)	1,069 (7.3)	1,332 (25.9)	815 (32.2)	379 (19.7)	135 (9.2)	55 (3.3)	4,133 (1.3)	411 (100.0)	4,544	1.32	0.27	
悪性高血圧				11 (%)	38 (2.5)	107 (8.6)	164 (24.3)	77 (37.3)	32 (17.5)	7 (7.3)	440 (1.6)	34 (0.9)	474 (100.0)	1.27	0.25	
糖尿病性腎症	17 (%)	34 (0.1)	253 (0.2)	1,729 (1.4)	5,329 (9.8)	5,834 (30.1)	2,913 (33.0)	1,097 (16.5)	328 (6.2)	160 (1.9)	17,694 (0.9)	2,088 (100.0)	19,782	1.26	0.25	
SLE腎炎				1 (%)	13 (0.2)	61 (3.0)	97 (14.2)	112 (22.5)	91 (26.0)	37 (21.1)	431 (8.6)	49 (4.4)	480 (100.0)	1.49	0.30	
アミロイド腎				2 (%)	15 (3.2)	17 (23.8)	14 (27.0)	10 (22.2)	5 (15.9)	63 (7.9)	7 (100.0)	70 (6.3)	70 (100.0)	1.39	0.26	
痛風腎				3 (%)	9 (1.6)	58 (4.7)	67 (30.2)	33 (34.9)	14 (17.2)	5 (7.3)	192 (2.6)	15 (1.6)	207 (100.0)	1.30	0.26	
先天性代謝異常による腎不全				1 (%)	2 (1.7)	8 (3.4)	16 (13.8)	18 (27.6)	5 (31.0)	7 (8.6)	58 (12.1)	8 (1.7)	66 (100.0)	1.42	0.29	
腎・尿路結核					4 (%)	4 (10.8)	12 (10.8)	7 (32.4)	6 (18.9)	3 (16.2)	37 (8.1)	3 (2.7)	40 (100.0)	1.40	0.29	
腎・尿路結石				2 (%)	5 (2.3)	23 (5.7)	24 (26.1)	20 (27.3)	11 (22.7)	3 (12.5)	88 (3.4)	12 (100.0)	100 (8.8)	1.32	0.25	
腎・尿路腫瘍				2 (%)	17 (1.5)	35 (13.0)	32 (26.7)	30 (24.4)	9 (22.9)	4 (6.9)	131 (1.5)	8 (3.1)	139 (100.0)	1.30	0.28	
閉塞性尿路障害	1 (%)	3 (0.8)	6 (2.3)	28 (4.7)	34 (21.7)	34 (26.4)	25 (19.4)	21 (16.3)	8 (6.2)	3 (2.3)	129 (100.0)	3 (100.0)	132	1.37	0.31	
骨髄腫	1 (%)			2 (4.8)	9 (9.5)	9 (42.9)	5 (9.5)	1 (23.8)	1 (4.8)	21 (100.0)	1 (4.8)	22 (100.0)	22	1.23	0.37	
腎形成不全					4 (%)	22 (2.7)	43 (15.1)	31 (29.5)	31 (21.2)	8 (21.2)	146 (5.5)	7 (4.8)	153 (100.0)	1.46	0.30	
不明	2 (%)	13 (0.0)	57 (0.3)	339 (1.2)	1,124 (7.0)	1,480 (23.1)	1,035 (30.4)	492 (21.2)	202 (10.1)	132 (4.1)	4,876 (2.7)	528 (100.0)	5,404	1.34	0.29	
再導入				1 (%)	1 (0.2)	18 (0.2)	95 (3.4)	149 (18.0)	131 (28.3)	74 (24.9)	32 (14.0)	527 (6.1)	37 (4.9)	564 (100.0)	1.43	0.30
その他	2 (%)	2 (0.2)	18 (0.2)	85 (1.4)	282 (6.7)	357 (22.3)	273 (28.2)	149 (21.6)	53 (11.8)	43 (4.2)	1,264 (3.4)	144 (100.0)	1,408	1.36	0.30	
合計	41 (%)	72 (0.1)	551 (1.0)	3,551 (6.7)	12,530 (23.7)	16,727 (31.7)	10,920 (20.7)	5,287 (10.0)	1,917 (3.6)	1,164 (2.2)	52,760 (100.0)	5,570 (2.2)	58,330	1.34	0.28	
記載なし																
総計	41 (%)	72 (0.1)	551 (1.0)	3,551 (6.7)	12,530 (23.7)	16,727 (31.7)	10,920 (20.7)	5,287 (10.0)	1,917 (3.6)	1,164 (2.2)	52,760 (100.0)	5,570 (2.2)	58,330	1.34	0.28	

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D2923##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査