

表 1019 nPCR(g/kg/day) 性別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

性別	0.4未満	0.4 ~	0.6 ~	0.8 ~	1.0 ~	1.2 ~	1.4 ~	1.6 ~	1.8 ~	2.0 ~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	196 (0.2)	5,206 (5.7)	31,094 (34.2)	39,428 (43.3)	12,992 (14.3)	1,858 (2.0)	187 (0.2)	17 (0.0)	6 (0.0)	3 (0.0)	90,987 (100.0)	11,503	102,490	0.84	0.17
女性 (%)	119 (0.2)	2,845 (5.5)	14,944 (28.9)	21,623 (41.8)	9,898 (19.2)	2,003 (3.9)	229 (0.4)	21 (0.0)	3 (0.0)	1 (0.0)	51,686 (100.0)	6,957	58,643	0.87	0.18
合計 (%)	315 (0.2)	8,051 (5.6)	46,038 (32.3)	61,051 (42.8)	22,890 (16.0)	3,861 (2.7)	416 (0.3)	38 (0.0)	9 (0.0)	4 (0.0)	142,673 (100.0)	18,460	161,133	0.85	0.17
記載なし (%)															
総計 (%)	315 (0.2)	8,051 (5.6)	46,038 (32.3)	61,051 (42.8)	22,890 (16.0)	3,861 (2.7)	416 (0.3)	38 (0.0)	9 (0.0)	4 (0.0)	142,673 (100.0)	18,460	161,133	0.85	0.17

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D3010##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査