

表 1022 nPCR(g/kg/day) 原疾患別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

原疾患	0.4未満	0.4~	0.6~	0.8~	1.0~	1.2~	1.4~	1.6~	1.8~	2.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎	69 (%) (0.2)	1,692 (3.8)	11,759 (26.7)	19,974 (45.3)	8,782 (19.9)	1,580 (3.6)	181 (0.4)	10 (0.0)	2 (0.0)		44,049 (100.0)	5,184	49,233	0.88	0.17
慢性腎盂腎炎	6 (%) (0.4)	64 (4.6)	377 (27.1)	610 (43.8)	281 (20.2)	50 (3.6)	3 (0.2)	1 (0.1)			1,392 (100.0)	161	1,553	0.87	0.17
急速進行性糸球体腎炎	3 (%) (0.3)	52 (4.7)	338 (30.8)	447 (40.7)	218 (19.9)	35 (3.2)	4 (0.4)				1,097 (100.0)	114	1,211	0.87	0.18
妊娠腎/妊娠中毒症	2 (%) (0.3)	11 (1.5)	179 (23.9)	313 (41.8)	199 (26.6)	38 (5.1)	7 (0.9)				749 (100.0)	61	810	0.92	0.18
その他の分類不能の腎炎	1 (%) (0.2)	29 (4.6)	165 (26.0)	276 (43.5)	125 (19.7)	34 (5.4)	4 (0.6)				634 (100.0)	75	709	0.89	0.18
多発性囊胞腎	10 (%) (0.2)	215 (3.8)	1,592 (28.2)	2,666 (47.3)	1,000 (17.7)	144 (2.6)	8 (0.1)	1 (0.0)			5,636 (100.0)	601	6,237	0.87	0.16
腎硬化症	37 (%) (0.3)	775 (5.9)	4,356 (33.1)	5,667 (43.0)	1,987 (15.1)	310 (2.4)	33 (0.3)	2 (0.0)			13,167 (100.0)	1,524	14,691	0.85	0.17
悪性高血圧	5 (%) (0.4)	65 (5.3)	348 (28.2)	542 (44.0)	226 (18.3)	41 (3.3)	5 (0.4)	1 (0.1)			1,233 (100.0)	136	1,369	0.87	0.18
糖尿病性腎症	131 (%) (0.2)	4,061 (7.4)	20,937 (38.3)	21,979 (40.2)	6,534 (11.9)	945 (1.7)	84 (0.2)	12 (0.0)	6 (0.0)	2 (0.0)	54,691 (100.0)	7,546	62,237	0.82	0.17
SLE腎炎	32 (%) (3.3)	223 (22.9)	424 (43.5)	237 (24.3)	50 (5.1)	8 (0.8)	1 (0.1)				975 (100.0)	120	1,095	0.91	0.18
アミロイド腎	17 (%) (10.2)	52 (31.1)	60 (35.9)	28 (16.8)	9 (5.4)	1 (0.6)					167 (100.0)	29	196	0.85	0.20
痛風腎	20 (%) (3.8)	165 (31.0)	225 (42.3)	95 (17.9)	22 (4.1)	5 (0.9)					532 (100.0)	65	597	0.88	0.18
先天性代謝異常による腎不全	2 (%) (1.6)	4 (3.3)	30 (24.4)	50 (40.7)	23 (18.7)	12 (9.8)	2 (1.6)				123 (100.0)	14	137	0.91	0.22
腎・尿路結核	1 (%) (1.2)	7 (8.3)	28 (33.3)	31 (36.9)	15 (17.9)	2 (2.4)					84 (100.0)	10	94	0.85	0.19
腎・尿路結石	16 (%) (5.8)	92 (33.1)	116 (41.7)	43 (15.5)	9 (3.2)			2 (0.7)			278 (100.0)	26	304	0.85	0.19
腎・尿路腫瘍	23 (%) (5.7)	126 (31.0)	179 (44.1)	66 (16.3)	11 (2.7)	1 (0.2)					406 (100.0)	36	442	0.85	0.16
閉塞性尿路障害	1 (%) (0.3)	18 (5.6)	108 (33.4)	119 (36.8)	68 (21.1)	8 (2.5)	1 (0.3)				323 (100.0)	32	355	0.86	0.18
骨髄腫	6 (%) (7.2)	29 (34.9)	33 (39.8)	13 (15.7)	2 (2.4)						83 (100.0)	9	92	0.84	0.18
腎形成不全	1 (%) (0.3)	4 (1.4)	50 (17.0)	139 (47.3)	78 (26.5)	20 (6.8)	2 (0.7)				294 (100.0)	32	326	0.94	0.17
不明	35 (%) (0.3)	747 (5.9)	3,951 (31.4)	5,392 (42.9)	2,059 (16.4)	344 (2.7)	45 (0.4)	5 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.0)	12,581 (100.0)	2,095	14,676	0.85	0.18
再導入	24 (%) (2.7)	182 (20.6)	391 (44.3)	228 (25.9)	52 (5.9)	5 (0.6)					882 (100.0)	85	967	0.92	0.18
その他	11 (%) (0.3)	169 (5.1)	951 (28.8)	1,418 (43.0)	585 (17.7)	143 (4.3)	17 (0.5)	3 (0.1)			3,297 (100.0)	505	3,802	0.87	0.18
合計	315 (%) (0.2)	8,051 (5.6)	46,038 (32.3)	61,051 (42.8)	22,890 (16.0)	3,861 (2.7)	416 (0.3)	38 (0.0)	9 (0.0)	4 (0.0)	142,673 (100.0)	18,460	161,133	0.85	0.17
記載なし															
総計	315 (%) (0.2)	8,051 (5.6)	46,038 (32.3)	61,051 (42.8)	22,890 (16.0)	3,861 (2.7)	416 (0.3)	38 (0.0)	9 (0.0)	4 (0.0)	142,673 (100.0)	18,460	161,133	0.85	0.17

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D3013#

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査