

表 1024 nPCR(g/kg/day) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

性別	0.4未満	0.4 ~	0.6 ~	0.8 ~	1.0 ~	1.2 ~	1.4 ~	1.6 ~	1.8 ~	2.0 ~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	34 (0.1)	1,428 (4.2)	10,719 (31.9)	15,091 (44.9)	5,466 (16.3)	788 (2.3)	68 (0.2)	3 (0.0)	4 (0.0)	1 (0.0)	33,602 (100.0)	3,565 (100.0)	37,167 (100.0)	0.86	0.16
女性 (%)	30 (0.2)	680 (3.5)	4,906 (25.6)	8,473 (44.2)	4,152 (21.6)	835 (4.4)	95 (0.5)	12 (0.1)	1 (0.0)	3 (0.0)	19,187 (100.0)	1,976 (100.0)	21,163 (100.0)	0.89	0.18
合計 (%)	64 (0.1)	2,108 (4.0)	15,625 (29.6)	23,564 (44.6)	9,618 (18.2)	1,623 (3.1)	163 (0.3)	15 (0.0)	5 (0.0)	4 (0.0)	52,789 (100.0)	5,541 (100.0)	58,330 (100.0)	0.87	0.17
記載なし (%)															
総計 (%)	64 (0.1)	2,108 (4.0)	15,625 (29.6)	23,564 (44.6)	9,618 (18.2)	1,623 (3.1)	163 (0.3)	15 (0.0)	5 (0.0)	4 (0.0)	52,789 (100.0)	5,541 (100.0)	58,330 (100.0)	0.87	0.17

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D3020##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査