

表 1026 nPCR(g/kg/day) 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	0.4未満	0.4~	0.6~	0.8~	1.0~	1.2~	1.4~	1.6~	1.8~	2.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年末満 (%)															
2年~ (%)	18 (0.1)	769 (5.4)	4,936 (34.7)	6,097 (42.8)	2,070 (14.5)	320 (2.2)	31 (0.2)	1 (0.0)	2 (0.0)		14,244 (100.0)	1,694	15,938	0.84	0.16
5年~ (%)	19 (0.1)	678 (4.3)	4,926 (31.0)	7,095 (44.7)	2,655 (16.7)	451 (2.8)	48 (0.3)	5 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)	15,880 (100.0)	1,702	17,582	0.86	0.17
10年~ (%)	18 (0.2)	328 (3.6)	2,568 (28.0)	4,080 (44.5)	1,852 (20.2)	283 (3.1)	30 (0.3)	4 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	9,165 (100.0)	951	10,116	0.88	0.17
15年~ (%)	4 (0.1)	149 (2.7)	1,377 (24.8)	2,581 (46.4)	1,202 (21.6)	219 (3.9)	25 (0.4)	2 (0.0)			5,559 (100.0)	499	6,058	0.90	0.17
20年~ (%)	2 (0.1)	91 (2.6)	823 (23.2)	1,670 (47.1)	814 (23.0)	133 (3.8)	9 (0.3)	1 (0.0)			3,543 (100.0)	314	3,857	0.90	0.16
25年~ (%)	3 (0.1)	43 (2.0)	460 (21.4)	1,020 (47.5)	507 (23.6)	104 (4.8)	10 (0.5)	1 (0.0)			2,148 (100.0)	197	2,345	0.91	0.17
30年~ (%)		22 (1.8)	297 (23.6)	578 (46.0)	288 (22.9)	64 (5.1)	5 (0.4)	1 (0.1)		1 (0.1)	1,256 (100.0)	111	1,367	0.91	0.17
35年~ (%)		17 (2.3)	163 (22.2)	336 (45.8)	175 (23.8)	38 (5.2)	4 (0.5)			1 (0.1)	734 (100.0)	46	780	0.91	0.18
40年~ (%)		11 (4.2)	75 (28.8)	107 (41.2)	55 (21.2)	11 (4.2)	1 (0.4)				260 (100.0)	27	287	0.88	0.18
合計 (%)	64 (0.1)	2,108 (4.0)	15,625 (29.6)	23,564 (44.6)	9,618 (18.2)	1,623 (3.1)	163 (0.3)	15 (0.0)	5 (0.0)	4 (0.0)	52,789 (100.0)	5,541	58,330	0.87	0.17
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	64 (0.1)	2,108 (4.0)	15,625 (29.6)	23,564 (44.6)	9,618 (18.2)	1,623 (3.1)	163 (0.3)	15 (0.0)	5 (0.0)	4 (0.0)	52,789 (100.0)	5,541	58,330	0.87	0.17
平均	9.00	8.58	9.58	10.90	12.02	12.80	12.39	13.87	5.00	21.50	10.68	9.84	10.60		
標準偏差	6.35	7.26	7.88	8.41	8.76	9.24	8.83	8.73	3.32	14.01	8.37	7.93	8.33		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D3022##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査