

表 1027 nPCR(g/kg/day) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

原疾患	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	18 (0.1)	474 (2.5)	4,499 (23.9)	8,867 (47.0)	4,169 (22.1)	747 (4.0)	72 (0.4)	4 (0.0)	2 (0.0)	2 (0.0)	18,854 (100.0)	1,846	20,700	0.90	0.17
慢性腎盂腎炎 (%)		15 (2.9)	134 (25.8)	237 (45.6)	109 (21.0)	21 (4.0)	3 (0.6)	1 (0.2)			520 (100.0)	51	571	0.89	0.17
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1 (0.3)	15 (4.2)	79 (21.9)	160 (44.4)	84 (23.3)	18 (5.0)	3 (0.8)				360 (100.0)	37	397	0.91	0.18
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	1 (0.2)	6 (1.4)	95 (22.8)	187 (45.0)	95 (22.8)	28 (6.7)	4 (1.0)				416 (100.0)	31	447	0.92	0.18
その他の分類不能の腎炎 (%)		9 (3.1)	79 (27.6)	114 (39.9)	73 (25.5)	10 (3.5)	1 (0.3)				286 (100.0)	31	317	0.89	0.17
多発性嚢胞腎 (%)	3 (0.1)	64 (3.0)	575 (27.3)	1,043 (49.5)	375 (17.8)	39 (1.9)	6 (0.3)				2,105 (100.0)	208	2,313	0.88	0.15
腎硬化症 (%)	3 (0.1)	182 (4.4)	1,291 (31.2)	1,872 (45.3)	662 (16.0)	118 (2.9)	8 (0.2)				4,136 (100.0)	408	4,544	0.86	0.16
悪性高血圧 (%)		16 (3.6)	130 (29.4)	201 (45.5)	76 (17.2)	17 (3.8)	2 (0.5)				442 (100.0)	32	474	0.88	0.17
糖尿病性腎症 (%)	28 (0.2)	1,009 (5.7)	6,560 (37.1)	7,447 (42.1)	2,311 (13.1)	315 (1.8)	26 (0.1)	4 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	17,702 (100.0)	2,080	19,782	0.83	0.16
SLE腎炎 (%)		10 (2.3)	88 (20.4)	196 (45.5)	106 (24.6)	26 (6.0)	4 (0.9)		1 (0.2)		431 (100.0)	49	480	0.92	0.19
アミロイド腎 (%)		4 (6.3)	19 (30.2)	26 (41.3)	14 (22.2)						63 (100.0)	7	70	0.85	0.16
痛風腎 (%)	1 (0.5)	9 (4.7)	65 (33.9)	79 (41.1)	34 (17.7)	4 (2.1)					192 (100.0)	15	207	0.86	0.16
先天性代謝異常による腎不全 (%)			12 (20.7)	25 (43.1)	18 (31.0)	2 (3.4)	1 (1.7)				58 (100.0)	8	66	0.92	0.16
腎・尿路結核 (%)		4 (10.8)	6 (16.2)	17 (45.9)	8 (21.6)	2 (5.4)					37 (100.0)	3	40	0.88	0.20
腎・尿路結石 (%)		1 (1.1)	29 (33.0)	42 (47.7)	12 (13.6)	2 (2.3)	2 (2.3)				88 (100.0)	12	100	0.88	0.17
腎・尿路腫瘍 (%)	1 (0.8)	4 (3.1)	41 (31.3)	63 (48.1)	18 (13.7)	4 (3.1)					131 (100.0)	8	139	0.86	0.17
閉塞性尿路障害 (%)		11 (8.5)	33 (25.6)	46 (35.7)	38 (29.5)	1 (0.8)					129 (100.0)	3	132	0.88	0.18
骨髄腫 (%)		3 (14.3)	4 (19.0)	8 (38.1)	3 (14.3)	2 (9.5)	1 (4.8)				21 (100.0)	1	22	0.89	0.26
腎形成不全 (%)			33 (22.6)	56 (38.4)	44 (30.1)	12 (8.2)	1 (0.7)				146 (100.0)	7	153	0.94	0.18
不明 (%)	7 (0.1)	214 (4.4)	1,403 (28.8)	2,098 (43.0)	949 (19.4)	183 (3.8)	20 (0.4)	4 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	4,880 (100.0)	524	5,404	0.88	0.18
再導入 (%)		8 (1.5)	95 (18.0)	244 (46.3)	150 (28.5)	26 (4.9)	3 (0.6)	1 (0.2)			527 (100.0)	37	564	0.93	0.17
その他 (%)	1 (0.1)	50 (4.0)	355 (28.1)	536 (42.4)	270 (21.3)	46 (3.6)	6 (0.5)	1 (0.1)			1,265 (100.0)	143	1,408	0.88	0.17
合計 (%)	64 (0.1)	2,108 (4.0)	15,625 (29.6)	23,564 (44.6)	9,618 (18.2)	1,623 (3.1)	163 (0.3)	15 (0.0)	5 (0.0)	4 (0.0)	52,789 (100.0)	5,541	58,330	0.87	0.17
記載なし (%)															
総計 (%)	64 (0.1)	2,108 (4.0)	15,625 (29.6)	23,564 (44.6)	9,618 (18.2)	1,623 (3.1)	163 (0.3)	15 (0.0)	5 (0.0)	4 (0.0)	52,789 (100.0)	5,541	58,330	0.87	0.17

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D3023##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査