

表 1030 %クレアチニン産生速度(%) 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

年齢	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)	1 (50.0)				1 (50.0)						2 (100.0)	1	3	70.90	36.91
15歳～ (%)	12 (4.6)	17 (6.5)	17 (6.5)	37 (14.1)	51 (19.4)	56 (21.3)	46 (17.5)	22 (8.4)	4 (1.5)	1 (0.4)	263 (100.0)	37	300	97.47	19.93
30歳～ (%)	229 (4.7)	194 (3.9)	336 (6.8)	568 (11.5)	786 (16.0)	1,004 (20.4)	874 (17.7)	577 (11.7)	260 (5.3)	96 (1.9)	4,924 (100.0)	829	5,753	101.09	22.40
45歳～ (%)	1,293 (5.5)	1,095 (4.7)	1,800 (7.7)	2,790 (12.0)	3,664 (15.7)	4,276 (18.3)	3,736 (16.0)	2,600 (11.1)	1,342 (5.8)	732 (3.1)	23,328 (100.0)	3,625	26,953	100.43	23.61
60歳～ (%)	4,414 (6.9)	3,342 (5.2)	5,383 (8.4)	7,621 (11.9)	9,681 (15.1)	10,654 (16.6)	9,578 (14.9)	6,937 (10.8)	3,915 (6.1)	2,641 (4.1)	64,166 (100.0)	9,024	73,190	99.68	25.35
75歳～ (%)	4,707 (10.5)	2,879 (6.4)	4,311 (9.6)	5,555 (12.4)	6,619 (14.7)	6,740 (15.0)	5,734 (12.8)	4,084 (9.1)	2,402 (5.4)	1,859 (4.1)	44,890 (100.0)	6,786	51,676	95.84	27.54
90歳～ (%)	398 (14.5)	202 (7.4)	292 (10.7)	383 (14.0)	353 (12.9)	373 (13.6)	309 (11.3)	203 (7.4)	130 (4.7)	98 (3.6)	2,741 (100.0)	517	3,258	91.67	29.07
合計 (%)	11,054 (7.9)	7,729 (5.5)	12,139 (8.7)	16,954 (12.1)	21,155 (15.1)	23,103 (16.5)	20,277 (14.5)	14,423 (10.3)	8,053 (5.7)	5,427 (3.9)	140,314 (100.0)	20,819	161,133	98.46	25.86
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	11,054 (7.9)	7,729 (5.5)	12,139 (8.7)	16,954 (12.1)	21,155 (15.1)	23,103 (16.5)	20,277 (14.5)	14,423 (10.3)	8,053 (5.7)	5,427 (3.9)	140,314 (100.0)	20,819	161,133	98.46	25.86
平均	72.04	70.49	69.92	68.96	68.39	67.63	67.47	67.65	68.40	70.16	68.73	68.72	68.73		
標準偏差	11.70	11.96	11.81	11.99	12.09	12.23	12.12	11.84	11.35	10.71	12.00	12.49	12.07		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
##D3111##  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2016年調査