

表 1032 %クレアチニン産生速度(%) 原疾患別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

原疾患	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	2,156 (5.0)	1,489 (3.4)	2,644 (6.1)	4,029 (9.3)	5,717 (13.2)	7,410 (17.1)	7,495 (17.3)	6,113 (14.1)	3,664 (8.5)	2,524 (5.8)	43,241 (100.0)	5,992	49,233	105.29	24.82
慢性腎盂腎炎 (%)	81 (5.9)	63 (4.6)	114 (8.3)	141 (10.3)	193 (14.0)	255 (18.5)	200 (14.5)	178 (12.9)	91 (6.6)	59 (4.3)	1,375 (100.0)	178	1,553	101.50	24.49
急速進行性糸球体腎炎 (%)	159 (14.8)	57 (5.3)	88 (8.2)	111 (10.3)	137 (12.7)	160 (14.9)	151 (14.0)	108 (10.0)	67 (6.2)	39 (3.6)	1,077 (100.0)	134	1,211	93.89	31.24
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	20 (2.7)	38 (5.1)	52 (7.0)	63 (8.5)	93 (12.6)	122 (16.5)	128 (17.3)	126 (17.1)	55 (7.5)	41 (5.6)	738 (100.0)	72	810	106.33	23.50
その他の分類不能の腎炎 (%)	39 (6.2)	23 (3.7)	41 (6.5)	51 (8.1)	90 (14.3)	103 (16.4)	125 (19.9)	85 (13.5)	37 (5.9)	34 (5.4)	628 (100.0)	81	709	103.37	26.45
多発性嚢胞腎 (%)	216 (3.9)	210 (3.8)	409 (7.4)	661 (11.9)	954 (17.2)	1,056 (19.0)	948 (17.1)	630 (11.4)	287 (5.2)	174 (3.1)	5,545 (100.0)	692	6,237	101.82	22.16
腎硬化症 (%)	987 (7.6)	669 (5.2)	1,029 (7.9)	1,461 (11.3)	1,834 (14.1)	2,130 (16.4)	1,932 (14.9)	1,413 (10.9)	877 (6.8)	653 (5.0)	12,985 (100.0)	1,706	14,691	100.32	26.42
悪性高血圧 (%)	100 (8.2)	60 (4.9)	76 (6.3)	118 (9.7)	165 (13.6)	207 (17.0)	196 (16.1)	135 (11.1)	95 (7.8)	63 (5.2)	1,215 (100.0)	154	1,369	101.02	27.19
糖尿病性腎症 (%)	5,520 (10.3)	4,036 (7.5)	6,138 (11.4)	8,157 (15.2)	9,165 (17.0)	8,490 (15.8)	6,125 (11.4)	3,568 (6.6)	1,678 (3.1)	963 (1.8)	53,840 (100.0)	8,397	62,237	91.91	24.61
SLE腎炎 (%)	101 (10.5)	72 (7.5)	91 (9.5)	123 (12.8)	146 (15.2)	158 (16.5)	135 (14.1)	71 (7.4)	41 (4.3)	20 (2.1)	958 (100.0)	137	1,095	93.07	26.58
アミロイド腎 (%)	33 (20.6)	18 (11.3)	14 (8.8)	13 (8.1)	30 (18.8)	16 (10.0)	14 (8.8)	11 (6.9)	6 (3.8)	5 (3.1)	160 (100.0)	36	196	86.37	32.56
痛風腎 (%)	20 (3.8)	17 (3.3)	27 (5.2)	63 (12.1)	69 (13.2)	78 (15.0)	98 (18.8)	72 (13.8)	41 (7.9)	36 (6.9)	521 (100.0)	76	597	106.40	24.17
先天性代謝異常による腎不全 (%)	12 (9.8)	6 (4.9)	10 (8.1)	13 (10.6)	16 (13.0)	21 (17.1)	27 (22.0)	10 (8.1)	7 (5.7)	1 (0.8)	123 (100.0)	14	137	97.01	24.91
腎・尿路結核 (%)	7 (8.4)	5 (6.0)	6 (7.2)	6 (7.2)	17 (20.5)	14 (16.9)	13 (15.7)	6 (7.2)	4 (4.8)	5 (6.0)	83 (100.0)	11	94	98.48	27.78
腎・尿路結石 (%)	14 (5.2)	8 (3.0)	16 (5.9)	31 (11.5)	31 (11.5)	47 (17.4)	58 (21.5)	26 (9.6)	22 (8.1)	17 (6.3)	270 (100.0)	34	304	105.63	26.67
腎・尿路腫瘍 (%)	19 (4.8)	17 (4.3)	32 (8.1)	32 (8.1)	41 (10.4)	68 (17.2)	63 (15.9)	60 (15.2)	29 (7.3)	34 (8.6)	395 (100.0)	47	442	105.73	26.15
閉塞性尿路障害 (%)	42 (13.4)	22 (7.0)	31 (9.9)	32 (10.2)	43 (13.7)	44 (14.1)	33 (10.5)	41 (13.1)	12 (3.8)	13 (4.2)	313 (100.0)	42	355	93.86	29.37
骨髄腫 (%)	13 (15.9)	6 (7.3)	10 (12.2)	9 (11.0)	11 (13.4)	10 (12.2)	8 (9.8)	9 (11.0)	6 (7.3)		82 (100.0)	10	92	89.83	28.72
腎形成不全 (%)	11 (3.9)	10 (3.5)	16 (5.6)	19 (6.7)	42 (14.8)	70 (24.6)	46 (16.2)	42 (14.8)	21 (7.4)	7 (2.5)	284 (100.0)	42	326	105.05	21.76
不明 (%)	1,117 (9.0)	691 (5.6)	992 (8.0)	1,356 (11.0)	1,760 (14.2)	1,935 (15.6)	1,858 (15.0)	1,304 (10.5)	790 (6.4)	570 (4.6)	12,373 (100.0)	2,303	14,676	98.80	27.26
再導入 (%)	47 (5.5)	28 (3.3)	39 (4.6)	102 (12.0)	123 (14.5)	178 (21.0)	135 (15.9)	111 (13.1)	59 (7.0)	26 (3.1)	848 (100.0)	119	967	102.81	23.72
その他 (%)	340 (10.4)	184 (5.6)	264 (8.1)	363 (11.1)	478 (14.7)	531 (16.3)	489 (15.0)	304 (9.3)	164 (5.0)	143 (4.4)	3,260 (100.0)	542	3,802	96.80	27.97
合計 (%)	11,054 (7.9)	7,729 (5.5)	12,139 (8.7)	16,954 (12.1)	21,155 (15.1)	23,103 (16.5)	20,277 (14.5)	14,423 (10.3)	8,053 (5.7)	5,427 (3.9)	140,314 (100.0)	20,819	161,133	98.46	25.86
記載なし (%)															
総計 (%)	11,054 (7.9)	7,729 (5.5)	12,139 (8.7)	16,954 (12.1)	21,155 (15.1)	23,103 (16.5)	20,277 (14.5)	14,423 (10.3)	8,053 (5.7)	5,427 (3.9)	140,314 (100.0)	20,819	161,133	98.46	25.86

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D3113##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査