

表 1034 %クレアチニン産生速度(%) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

性別	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	1,740 (5.2)	1,551 (4.7)	2,754 (8.3)	4,002 (12.0)	5,104 (15.3)	5,689 (17.1)	5,233 (15.7)	3,733 (11.2)	2,088 (6.3)	1,387 (4.2)	33,281 (100.0)	3,886	37,167	101.22	24.13
女性 (%)	994 (5.2)	876 (4.6)	1,425 (7.5)	2,191 (11.6)	2,893 (15.3)	3,342 (17.6)	3,088 (16.3)	2,198 (11.6)	1,216 (6.4)	738 (3.9)	18,961 (100.0)	2,202	21,163	101.52	24.25
合計 (%)	2,734 (5.2)	2,427 (4.6)	4,179 (8.0)	6,193 (11.9)	7,997 (15.3)	9,031 (17.3)	8,321 (15.9)	5,931 (11.4)	3,304 (6.3)	2,125 (4.1)	52,242 (100.0)	6,088	58,330	101.33	24.17
記載なし (%)															
総計 (%)	2,734 (5.2)	2,427 (4.6)	4,179 (8.0)	6,193 (11.9)	7,997 (15.3)	9,031 (17.3)	8,321 (15.9)	5,931 (11.4)	3,304 (6.3)	2,125 (4.1)	52,242 (100.0)	6,088	58,330	101.33	24.17

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D3120##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査