

表 1037 %クレアチニン産生速度(%) 原疾患別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

原疾患	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	548 (2.9)	544 (2.9)	1,031 (5.5)	1,674 (9.0)	2,543 (13.6)	3,352 (17.9)	3,475 (18.6)	2,838 (15.2)	1,616 (8.7)	1,055 (5.6)	18,676 (100.0)	2,024	20,700	107.28	22.60
慢性腎盂腎炎 (%)	12 (2.3)	22 (4.2)	40 (7.7)	67 (12.9)	72 (13.9)	89 (17.1)	100 (19.3)	66 (12.7)	31 (6.0)	20 (3.9)	519 (100.0)	52	571	103.49	22.10
急速進行性糸球体腎炎 (%)	28 (7.9)	16 (4.5)	21 (5.9)	35 (9.9)	38 (10.7)	78 (22.0)	55 (15.5)	41 (11.6)	24 (6.8)	18 (5.1)	354 (100.0)	43	397	101.33	26.60
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	11 (2.7)	12 (2.9)	29 (7.1)	40 (9.8)	63 (15.4)	78 (19.1)	71 (17.4)	46 (11.3)	41 (10.0)	17 (4.2)	408 (100.0)	39	447	105.67	22.04
その他の分類不能の腎炎 (%)	10 (3.5)	11 (3.9)	15 (5.3)	33 (11.7)	45 (15.9)	52 (18.4)	55 (19.4)	37 (13.1)	17 (6.0)	8 (2.8)	283 (100.0)	34	317	103.33	21.91
多発性嚢胞腎 (%)	66 (3.2)	73 (3.5)	143 (6.9)	258 (12.4)	365 (17.5)	419 (20.1)	374 (17.9)	224 (10.7)	111 (5.3)	52 (2.5)	2,085 (100.0)	228	2,313	102.23	21.39
腎硬化症 (%)	211 (5.1)	164 (4.0)	307 (7.5)	467 (11.4)	595 (14.5)	643 (15.7)	693 (16.9)	491 (12.0)	288 (7.0)	247 (6.0)	4,106 (100.0)	438	4,544	103.22	25.14
悪性高血圧 (%)	27 (6.2)	10 (2.3)	27 (6.2)	38 (8.7)	62 (14.2)	73 (16.7)	91 (20.9)	46 (10.6)	35 (8.0)	27 (6.2)	436 (100.0)	38	474	104.80	26.35
糖尿病性腎症 (%)	1,320 (7.5)	1,255 (7.2)	1,975 (11.3)	2,731 (15.6)	3,091 (16.6)	2,902 (16.6)	2,098 (12.0)	1,238 (7.1)	597 (3.4)	309 (1.8)	17,516 (100.0)	2,266	19,782	93.92	23.29
SLE腎炎 (%)	30 (7.0)	27 (6.3)	38 (8.9)	51 (11.9)	68 (15.9)	79 (18.5)	65 (15.2)	38 (8.9)	26 (6.1)	5 (1.2)	427 (100.0)	53	480	97.68	24.98
アミロイド腎 (%)	7 (11.7)	6 (10.0)	4 (6.7)	5 (8.3)	12 (20.0)	8 (13.3)	11 (18.3)	4 (6.7)	2 (3.3)	1 (1.7)	60 (100.0)	10	70	92.12	27.81
痛風腎 (%)	10 (5.3)	4 (2.1)	9 (4.7)	18 (9.5)	28 (14.7)	30 (15.8)	31 (16.3)	25 (13.2)	18 (9.5)	17 (8.9)	190 (100.0)	17	207	107.25	24.85
先天性代謝異常による腎不全 (%)	2 (3.4)	3 (5.2)	6 (10.3)	11 (19.0)	8 (13.8)	8 (13.8)	9 (15.5)	6 (10.3)	3 (5.2)	2 (3.4)	58 (100.0)	8	66	100.12	21.71
腎・尿路結核 (%)	1 (2.7)	2 (5.4)	3 (8.1)	2 (5.4)	10 (27.0)	6 (16.2)	7 (18.9)	3 (8.1)	3 (8.1)		37 (100.0)	3	40	100.97	19.65
腎・尿路結石 (%)	2 (2.3)	4 (4.5)	3 (3.4)	13 (14.8)	14 (15.9)	8 (9.1)	14 (15.9)	13 (14.8)	9 (10.2)	8 (9.1)	88 (100.0)	12	100	108.83	27.96
腎・尿路腫瘍 (%)	4 (3.1)	5 (3.9)	4 (3.1)	15 (11.7)	14 (10.9)	21 (16.4)	25 (19.5)	19 (14.8)	11 (8.6)	10 (7.8)	128 (100.0)	11	139	108.71	23.89
閉塞性尿路障害 (%)	14 (11.0)	7 (5.5)	13 (10.2)	8 (6.3)	20 (15.7)	20 (15.7)	23 (18.1)	13 (10.2)	7 (5.5)	2 (1.6)	127 (100.0)	5	132	95.70	27.95
骨髄腫 (%)	3 (14.3)	2 (9.5)	5 (23.8)	2 (9.5)	2 (9.5)	2 (9.5)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	2 (9.5)	21 (100.0)	1	22	88.58	32.43
腎形成不全 (%)	4 (2.8)		9 (6.3)	13 (9.1)	23 (16.1)	26 (18.2)	29 (20.3)	17 (11.9)	16 (11.2)	6 (4.2)	143 (100.0)	10	153	107.95	20.44
不明 (%)	294 (6.1)	189 (3.9)	370 (7.7)	517 (10.7)	671 (13.9)	801 (16.6)	805 (16.7)	579 (12.0)	349 (7.3)	238 (4.9)	4,813 (100.0)	591	5,404	102.23	25.57
再導入 (%)	24 (4.6)	16 (3.1)	27 (5.2)	52 (10.0)	75 (14.4)	112 (21.5)	101 (19.4)	72 (13.8)	26 (5.0)	15 (2.9)	520 (100.0)	44	564	103.68	22.36
その他 (%)	106 (8.5)	55 (4.4)	100 (8.0)	143 (11.5)	178 (14.3)	224 (18.0)	188 (15.1)	114 (9.1)	73 (5.9)	66 (5.3)	1,247 (100.0)	161	1,408	99.63	26.92
合計 (%)	2,734 (5.2)	2,427 (4.6)	4,179 (8.0)	6,193 (11.9)	7,997 (15.3)	9,031 (17.3)	8,321 (15.9)	5,931 (11.4)	3,304 (6.3)	2,125 (4.1)	52,242 (100.0)	6,088	58,330	101.33	24.17
記載なし (%)															
総計 (%)	2,734 (5.2)	2,427 (4.6)	4,179 (8.0)	6,193 (11.9)	7,997 (15.3)	9,031 (17.3)	8,321 (15.9)	5,931 (11.4)	3,304 (6.3)	2,125 (4.1)	52,242 (100.0)	6,088	58,330	101.33	24.17

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D3123##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査