

表 1039 糖尿病の有無 治療方法別 (透析患者全体)

治療方法	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析 (%)	89,333 (44.1)	113,458 (55.9)	202,791 (100.0)	30,913		233,704
血液透析濾過 (%)	31,744 (49.2)	32,773 (50.8)	64,517 (100.0)	10,282		74,799
血液濾過 (%)	8 (44.4)	10 (55.6)	18 (100.0)	1		19
血液吸着透析 (%)	980 (88.5)	127 (11.5)	1,107 (100.0)	248		1,355
在宅血液透析 (%)	404 (75.0)	135 (25.0)	539 (100.0)	78		617
腹膜透析 (%)	3,306 (48.6)	3,499 (51.4)	6,805 (100.0)	1,810		8,615
合計 (%)	125,775 (45.6)	150,002 (54.4)	275,777 (100.0)	43,332		319,109
記載なし (%)						
総計 (%)	125,775 (45.6)	150,002 (54.4)	275,777 (100.0)	43,332		319,109

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がない患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

##D3210##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査