

表 1041 糖尿病の有無 併用の状況別 (透析患者全体)

併用の状況	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)	122,334 (45.5)	146,349 (54.5)	268,683 (100.0)	41,455		310,138
PD単独 (%)	2,601 (48.0)	2,821 (52.0)	5,422 (100.0)	1,509		6,931
HD(F)単独.PDカテあり (%)	81 (52.6)	73 (47.4)	154 (100.0)	23		177
PD.HD併用週1HD(F) (%)	628 (51.0)	603 (49.0)	1,231 (100.0)	265		1,496
PD.HD併用週2HD(F) (%)	73 (53.3)	64 (46.7)	137 (100.0)	28		165
PD.HD併用週3HD(F) (%)	15 (46.9)	17 (53.1)	32 (100.0)	5		37
PD.HD併用週4HD(F) (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
PD.HD併用その他 (%)	32 (58.2)	23 (41.8)	55 (100.0)	8		63
合計 (%)	125,765 (45.6)	149,950 (54.4)	275,715 (100.0)	43,293		319,008
不明 (%)	10 (50.0)	10 (50.0)	20 (100.0)	2		22
記載なし (%)		42 (100.0)	42 (100.0)	37		79
総計 (%)	125,775 (45.6)	150,002 (54.4)	275,777 (100.0)	43,332		319,109

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がない患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

##D3212##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査