

表 1043 糖尿病の有無 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満	66	1	67	26		93
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
15歳～	623	61	684	227		911
(%)	(91.1)	(8.9)	(100.0)			
30歳～	6,587	4,664	11,251	2,171		13,422
(%)	(58.5)	(41.5)	(100.0)			
45歳～	22,660	27,183	49,843	7,501		57,344
(%)	(45.5)	(54.5)	(100.0)			
60歳～	52,652	70,896	123,548	18,081		141,629
(%)	(42.6)	(57.4)	(100.0)			
75歳～	40,142	45,238	85,380	14,233		99,613
(%)	(47.0)	(53.0)	(100.0)			
90歳～	3,045	1,959	5,004	1,091		6,095
(%)	(60.9)	(39.1)	(100.0)			
合計	125,775	150,002	275,777	43,330		319,107
(%)	(45.6)	(54.4)	(100.0)			
不明						
(%)						
記載なし				2		2
(%)						
総計	125,775	150,002	275,777	43,332		319,109
(%)	(45.6)	(54.4)	(100.0)			
平均	67.98	68.22	68.11	68.35		68.15
標準偏差	13.33	11.47	12.35	13.29		12.48

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往が有りの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

##D3214##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査