

表 1044 糖尿病の有無 透析歴(年)別 (透析患者全体)

透析歴	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	23,413 (38.0)	38,267 (62.0)	61,680 (100.0)	8,858		70,538
2年～ (%)	25,501 (36.0)	45,331 (64.0)	70,832 (100.0)	9,336		80,168
5年～ (%)	27,671 (39.7)	41,971 (60.3)	69,642 (100.0)	9,503		79,145
10年～ (%)	18,046 (52.0)	16,655 (48.0)	34,701 (100.0)	5,855		40,556
15年～ (%)	12,807 (70.8)	5,285 (29.2)	18,092 (100.0)	4,002		22,094
20年～ (%)	8,342 (84.2)	1,567 (15.8)	9,909 (100.0)	2,575		12,484
25年～ (%)	4,894 (90.7)	504 (9.3)	5,398 (100.0)	1,499		6,897
30年～ (%)	2,868 (93.1)	211 (6.9)	3,079 (100.0)	908		3,987
35年～ (%)	1,602 (93.9)	104 (6.1)	1,706 (100.0)	446		2,152
40年～ (%)	582 (94.6)	33 (5.4)	615 (100.0)	178		793
合計 (%)	125,726 (45.6)	149,928 (54.4)	275,654 (100.0)	43,160		318,814
不明 (%)	49 (39.8)	74 (60.2)	123 (100.0)	172		295
記載なし (%)						
総計 (%)	125,775 (45.6)	150,002 (54.4)	275,777 (100.0)	43,332		319,109
平均	9.47	5.14	7.12	8.84		7.35
標準偏差	8.97	4.92	7.38	8.72		7.60

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がない患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

##D3215##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査