

表 1045 糖尿病の有無 原疾患別 (透析患者全体)

原疾患	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性系球体腎炎	60,962	10,127	71,089	20,694		91,783
(%)	(85.8)	(14.2)	(100.0)			
慢性腎孟腎炎	1,939	348	2,287	609		2,896
(%)	(84.8)	(15.2)	(100.0)			
急速進行性系球体腎炎	1,485	517	2,002	536		2,538
(%)	(74.2)	(25.8)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	1,065	114	1,179	304		1,483
(%)	(90.3)	(9.7)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	936	165	1,101	353		1,454
(%)	(85.0)	(15.0)	(100.0)			
多発性囊胞腎	8,117	890	9,007	2,464		11,471
(%)	(90.1)	(9.9)	(100.0)			
腎硬化症	20,019	4,950	24,969	6,681		31,650
(%)	(80.2)	(19.8)	(100.0)			
悪性高血圧	1,800	323	2,123	598		2,721
(%)	(84.8)	(15.2)	(100.0)			
糖尿病性腎症		123,657	123,657			123,657
(%)		(100.0)	(100.0)			
SLE腎炎	1,407	329	1,736	486		2,222
(%)	(81.0)	(19.0)	(100.0)			
アミロイド腎	260	79	339	99		438
(%)	(76.7)	(23.3)	(100.0)			
痛風腎	737	106	843	213		1,056
(%)	(87.4)	(12.6)	(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	186	41	227	54		281
(%)	(81.9)	(18.1)	(100.0)			
腎・尿路結核	117	14	131	37		168
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
腎・尿路結石	397	76	473	105		578
(%)	(83.9)	(16.1)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	616	141	757	202		959
(%)	(81.4)	(18.6)	(100.0)			
閉塞性尿路障害	503	74	577	166		743
(%)	(87.2)	(12.8)	(100.0)			
骨髄腫	213	50	263	60		323
(%)	(81.0)	(19.0)	(100.0)			
腎形成不全	479	43	522	142		664
(%)	(91.8)	(8.2)	(100.0)			
不明	18,264	5,879	24,143	7,269		31,412
(%)	(75.6)	(24.4)	(100.0)			
再導入	1,403	343	1,746	428		2,174
(%)	(80.4)	(19.6)	(100.0)			
その他	4,870	1,736	6,606	1,832		8,438
(%)	(73.7)	(26.3)	(100.0)			
合計	125,775	150,002	275,777	43,332		319,109
(%)	(45.6)	(54.4)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	125,775	150,002	275,777	43,332		319,109
(%)	(45.6)	(54.4)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がない患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

##D3216##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査