

表 1051 糖尿病の有無 大腿骨近位部骨折の既往別（透析患者全体）

| 大腿骨近位部 骨折の既往 | 糖尿病なし | 糖尿病あり | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|------|---------|
| 既往なし | 117,515 | 106,685 | 224,200 | 626 | | 224,826 |
| (%) | (52.4) | (47.6) | (100.0) | | | |
| 既往あり | 4,859 | 5,988 | 10,847 | 802 | | 11,649 |
| (%) | (44.8) | (55.2) | (100.0) | | | |
| 合計 | 122,374 | 112,673 | 235,047 | 1,428 | | 236,475 |
| (%) | (52.1) | (47.9) | (100.0) | | | |
| 不明 | 261 | 393 | 654 | 113 | | 767 |
| (%) | (39.9) | (60.1) | (100.0) | | | |
| 記載なし | 3,140 | 36,936 | 40,076 | 41,791 | | 81,867 |
| (%) | (7.8) | (92.2) | (100.0) | | | |
| 総計 | 125,775 | 150,002 | 275,777 | 43,332 | | 319,109 |
| (%) | (45.6) | (54.4) | (100.0) | | | |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D3222##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査