

表 1057 糖尿病の有無 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (透析患者全体)

透析前 アルブミン濃度	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	69 (37.3)	116 (62.7)	185 (100.0)	16		201
1.5 ~ (%)	411 (40.7)	598 (59.3)	1,009 (100.0)	110		1,119
2.0 ~ (%)	1,753 (40.2)	2,612 (59.8)	4,365 (100.0)	447		4,812
2.5 ~ (%)	7,268 (44.5)	9,060 (55.5)	16,328 (100.0)	1,775		18,103
3.0 ~ (%)	32,682 (47.4)	36,296 (52.6)	68,978 (100.0)	7,690		76,668
3.5 ~ (%)	59,922 (47.7)	65,711 (52.3)	125,633 (100.0)	13,794		139,427
4.0 ~ (%)	18,527 (47.6)	20,355 (52.4)	38,882 (100.0)	4,279		43,161
4.5 ~ (%)	1,013 (53.2)	892 (46.8)	1,905 (100.0)	211		2,116
5.0 ~ (%)	65 (48.5)	69 (51.5)	134 (100.0)	10		144
合計 (%)	121,710 (47.3)	135,709 (52.7)	257,419 (100.0)	28,332		285,751
記載なし (%)	4,065 (22.1)	14,293 (77.9)	18,358 (100.0)	15,000		33,358
総計 (%)	125,775 (45.6)	150,002 (54.4)	275,777 (100.0)	43,332		319,109
平均	3.56	3.54	3.55	3.55		3.55
標準偏差	0.43	0.45	0.44	0.44		0.44

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がない患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

##D3228##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査