

表 1058 糖尿病の有無 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

透析前補正 カルシウム濃度	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	568 (47.7)	623 (52.3)	1,191 (100.0)	103		1,294
7.0～ (%)	735 (44.1)	930 (55.9)	1,665 (100.0)	168		1,833
7.5～ (%)	2,857 (44.4)	3,580 (55.6)	6,437 (100.0)	702		7,139
8.0～ (%)	7,624 (43.0)	10,111 (57.0)	17,735 (100.0)	1,853		19,588
8.4～ (%)	3,252 (41.4)	4,605 (58.6)	7,857 (100.0)	833		8,690
8.5～ (%)	28,429 (44.0)	36,202 (56.0)	64,631 (100.0)	6,682		71,313
9.0～ (%)	36,105 (47.1)	40,561 (52.9)	76,666 (100.0)	8,272		84,938
9.5～ (%)	24,770 (51.2)	23,640 (48.8)	48,410 (100.0)	5,627		54,037
10.0～ (%)	3,215 (52.9)	2,860 (47.1)	6,075 (100.0)	724		6,799
10.1～ (%)	7,946 (53.9)	6,808 (46.1)	14,754 (100.0)	1,727		16,481
10.5～ (%)	3,922 (54.0)	3,343 (46.0)	7,265 (100.0)	831		8,096
11.0～ (%)	1,208 (51.4)	1,140 (48.6)	2,348 (100.0)	321		2,669
11.5～ (%)	456 (52.8)	407 (47.2)	863 (100.0)	94		957
12.0～ (%)	279 (51.1)	267 (48.9)	546 (100.0)	77		623
合計 (%)	121,366 (47.3)	135,077 (52.7)	256,443 (100.0)	28,014		284,457
記載なし (%)	4,409 (22.8)	14,925 (77.2)	19,334 (100.0)	15,318		34,652
総計 (%)	125,775 (45.6)	150,002 (54.4)	275,777 (100.0)	43,332		319,109
平均	9.21	9.11	9.16	9.20		9.16
標準偏差	0.75	0.73	0.74	0.75		0.75

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

\*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がない患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

#D3229##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査