

表 1060 糖尿病の有無 PTH値(pg/mL)別 (透析患者全体) PTH測定法:intact-PTH

PTH値	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	4,649 (48.4)	4,959 (51.6)	9,608 (100.0)	996		10,604
20～ (%)	6,562 (44.9)	8,062 (55.1)	14,624 (100.0)	1,531		16,155
40～ (%)	7,371 (45.6)	8,810 (54.4)	16,181 (100.0)	1,638		17,819
60～ (%)	8,057 (46.4)	9,291 (53.6)	17,348 (100.0)	1,795		19,143
80～ (%)	8,399 (46.4)	9,685 (53.6)	18,084 (100.0)	1,973		20,057
100～ (%)	8,226 (47.0)	9,288 (53.0)	17,514 (100.0)	1,926		19,440
120～ (%)	8,120 (46.7)	9,272 (53.3)	17,392 (100.0)	1,814		19,206
140～ (%)	7,398 (46.4)	8,543 (53.6)	15,941 (100.0)	1,711		17,652
160～ (%)	6,782 (46.9)	7,666 (53.1)	14,448 (100.0)	1,486		15,934
180～ (%)	15,485 (47.1)	17,387 (52.9)	32,872 (100.0)	3,635		36,507
240～ (%)	213 (48.3)	228 (51.7)	441 (100.0)	45		486
241～ (%)	9,430 (48.2)	10,132 (51.8)	19,562 (100.0)	2,124		21,686
300～ (%)	5,393 (49.3)	5,552 (50.7)	10,945 (100.0)	1,252		12,197
360～ (%)	3,202 (51.1)	3,064 (48.9)	6,266 (100.0)	699		6,965
420～ (%)	2,010 (52.7)	1,802 (47.3)	3,812 (100.0)	466		4,278
480～ (%)	517 (54.9)	425 (45.1)	942 (100.0)	107		1,049
500～ (%)	814 (54.9)	670 (45.1)	1,484 (100.0)	192		1,676
540～ (%)	903 (54.7)	749 (45.3)	1,652 (100.0)	217		1,869
600～ (%)	1,621 (58.1)	1,170 (41.9)	2,791 (100.0)	337		3,128
800～ (%)	1,456 (66.0)	749 (34.0)	2,205 (100.0)	315		2,520
合計 (%)	106,608 (47.6)	117,504 (52.4)	224,112 (100.0)	24,259		248,371
記載なし (%)	1,860 (40.2)	2,768 (59.8)	4,628 (100.0)	897		5,525
総計 (%)	108,468 (47.4)	120,272 (52.6)	228,740 (100.0)	25,156		253,896
平均	186.69	168.72	177.26	185.56		178.07
標準偏差	190.66	147.10	169.46	183.71		170.93

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がない患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

##D3231##