

表 1061 糖尿病の有無 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別 (透析患者全体)

透析前 ヘモグロビン濃度	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
5未満 (%)	145 (57.5)	107 (42.5)	252 (100.0)	50		302
5~ (%)	204 (48.3)	218 (51.7)	422 (100.0)	15		437
6~ (%)	423 (43.4)	552 (56.6)	975 (100.0)	92		1,067
7~ (%)	1,683 (46.3)	1,955 (53.7)	3,638 (100.0)	382		4,020
8~ (%)	5,700 (45.5)	6,834 (54.5)	12,534 (100.0)	1,268		13,802
9~ (%)	18,369 (46.2)	21,368 (53.8)	39,737 (100.0)	4,207		43,944
10~ (%)	40,093 (47.5)	44,360 (52.5)	84,453 (100.0)	9,367		93,820
11~ (%)	36,227 (48.3)	38,767 (51.7)	74,994 (100.0)	8,373		83,367
12~ (%)	14,121 (47.4)	15,679 (52.6)	29,800 (100.0)	3,236		33,036
13~ (%)	3,648 (45.5)	4,361 (54.5)	8,009 (100.0)	914		8,923
14~ (%)	1,440 (45.6)	1,717 (54.4)	3,157 (100.0)	369		3,526
合計 (%)	122,053 (47.3)	135,918 (52.7)	257,971 (100.0)	28,273		286,244
記載なし (%)	3,722 (20.9)	14,084 (79.1)	17,806 (100.0)	15,059		32,865
総計 (%)	125,775 (45.6)	150,002 (54.4)	275,777 (100.0)	43,332		319,109
平均	10.81	10.79	10.80	10.82		10.80
標準偏差	1.29	1.31	1.30	1.31		1.30

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がないの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

##D3232##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査