

表 1062 糖尿病の有無 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

総コレステロール濃度	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	2,519 (30.9)	5,624 (69.1)	8,143 (100.0)	615		8,758
100～ (%)	8,250 (35.9)	14,748 (64.1)	22,998 (100.0)	2,001		24,999
120～ (%)	17,713 (41.9)	24,543 (58.1)	42,256 (100.0)	4,158		46,414
140～ (%)	22,974 (47.1)	25,803 (52.9)	48,777 (100.0)	5,360		54,137
160～ (%)	21,133 (52.0)	19,500 (48.0)	40,633 (100.0)	4,839		45,472
180～ (%)	14,454 (55.1)	11,760 (44.9)	26,214 (100.0)	3,355		29,569
200～ (%)	8,112 (57.7)	5,939 (42.3)	14,051 (100.0)	1,769		15,820
220～ (%)	3,744 (58.8)	2,623 (41.2)	6,367 (100.0)	817		7,184
240～ (%)	1,531 (57.5)	1,131 (42.5)	2,662 (100.0)	316		2,978
260～ (%)	1,069 (56.4)	827 (43.6)	1,896 (100.0)	213		2,109
合計 (%)	101,499 (47.4)	112,498 (52.6)	213,997 (100.0)	23,443		237,440
記載なし (%)	24,276 (39.3)	37,504 (60.7)	61,780 (100.0)	19,889		81,669
総計 (%)	125,775 (45.6)	150,002 (54.4)	275,777 (100.0)	43,332		319,109
平均	161.73	151.46	156.33	160.55		156.74
標準偏差	36.11	35.92	36.38	35.54		36.32

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がない患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

##D3233##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査